

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Внимательно прочтайте содержание этого листка-вкладыша, так как он содержит важную для вас информацию.


Это лекарственное средство отпускается без рецепта. Однако для достижения наилучших результатов Иммунал следует принимать строго в соответствии с инструкциями.

- Сохраните этот листок-вкладыш. У вас может возникнуть необходимость перечитать его.
- Если у вас есть необходимость в получении дополнительной информации или совета, спрашивайте у своего фармацевта.
- Если в течение 10 дней не отмечается улучшения или симптомы заболевания ухудшаются, вы должны обратиться к врачу.
- Если какие-то побочные эффекты становятся серьезными или вы заметили любые побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что такое таблетки Иммунал, и для чего они применяются
2. Перед применением таблеток Иммунал
3. Как принимать таблетки Иммунал
4. Возможные побочные эффекты
5. Условия хранения

Иммунал®/ Immunal®
таблетки 80 мг
Echinacea purpurea (L.) succus



Состав

Действующее вещество: В 1 таблетке содержится 80 мг высущенного сока, полученного из свежесобранный цветущей эхинацеи пурпурной (*Echinacea purpurea L., succus*), свежее растение: высущенный сок = 30-60 : 1.

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный безводный, сахарин натрия Е954, ванилин, вишневая отдушка.

Описание

круглые, плоские с обеих сторон таблетки светло-коричневого цвета, с вкраплениями.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере из ПВХ/ПВДХ и алюминиевой фольги.
 2 или 4 блистера вместе с листком-вкладышем в картонной коробке.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель
 Лек д.д., Веровшкова 57, Любляна, Словения

1. ЧТО ТАКОЕ ТАБЛЕТКИ ИММУНАЛ, И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

Действующим веществом таблеток Иммунал является сок эхинацеи пурпурной. Механизм действия не установлен.

Показания к применению

Кратковременная профилактика и лечение в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

2. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ТАБЛЕТОК ИММУНАЛ

Не принимайте таблетки Иммунал, если у вас

- повышенная чувствительность к компонентам препарата, эхинацеи и растениям семейства сложноцветных (ромашка, арника, календула, тысячелистник);
- прогрессирующие системные заболевания, например, туберкулез и саркоидоз;
- аутоиммунные заболевания, такие как коллагенозы и рассеянный склероз;
- иммунодефицит (ВИЧ-инфекция, СПИД);
- терапия, которая вызывает подавление иммунной системы, например, лечение рака или лечение в связи с трансплантацией органа или костного мозга;
- любое заболевание системы крови с поражением лейкоцитов (например, лейкоз, лейкемия);
- аллергический диатез (например, уртикария, атопический дерматит, астма).

Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет.

Меры предосторожности

Не превышайте рекомендованную дозу.

Необходимо посоветоваться с врачом если:

- наблюдается ухудшение симптомов заболевания или отмечается высокая температура тела,
- симптомы не проходят в течение 10 дней,
- имеется наследственная склонность к аллергиям.

Прием других лекарственных средств

Исследования по взаимодействию эхинацеи пурпурной с другими лекарственными препаратами не проводились. Однако не рекомендуется применять таблетки Иммунал в период приема иммunosупрессивных лекарств, таких как циклоспорин и метотрексат.

Перед совместным приемом с другими лекарственными препаратами пациент должен проконсультироваться с врачом.

Беременность и кормление грудью

В связи с отсутствием достаточных данных применение лекарственного средства в период беременности и лактации не рекомендуется. Данные о влиянии лекарственного средства на fertильность отсутствуют.

Вождение автотранспорта и управление механизмами

Исследования по оценке влияния эхинацеи на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Информация о некоторых компонентах препарата

Таблетки Иммунал содержат лактозу. Если у вас имеется **непереносимость некоторых сахаров**, то перед применением таблеток посоветуйтесь со своим врачом.

3. КАК ПРИНИМАТЬ ТАБЛЕТКИ ИММУНАЛ

Прием следует начинать при появлении первых признаков заболевания.

Взрослые и подростки старше 12 лет, а также пациенты пожилого возраста:
по 1 таблетке 3 - 4 раза в день.

Лекарственное средство не рекомендовано для детей до 12 лет.

Перед приемом препарата детьми необходима консультация врача.

Способ применения

Для приема внутрь.

Таблетку следует запить водой.

Продолжительность приема

Курс лечения не должен превышать 10 дней.

Если симптомы сохраняются больше 10 дней, необходимо посоветоваться с врачом или фармацевтом.

Передозировка

Случаи передозировки эхинацеей пурпурной не описаны.

Если после приема избыточной дозы ваше состояние ухудшилось – обратитесь к врачу.

Если вы забыли принять Иммунал

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать прием разовых доз.

Следует продолжать прием препарата по предписанному графику.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Как и все лекарства, таблетки Иммунал могут вызывать нежелательные эффекты, хотя развиваются они не у каждого.

Частота побочных эффектов неизвестна. В отдельных случаях может возникать реакция гиперчувствительности, проявляющаяся в виде кожной сыпи, зуда, отека лица (редко), бронхоспазма (чувство сдавления в грудной клетке, хрипы и одышка), приступа астмы, синдрома Стивенса-Джонсона (болезненная кожная реакция в результате аллергической реакции), анафилактического шока. В таком случае немедленно прекратите прием лекарства и свяжитесь со своим врачом.

Связь с аутоиммунными заболеваниями (рассеянный склероз, диссеминированный энцефалит, узловатая эритема, иммунотромбоцитопения, синдром Эванса, синдром Шегрена с тубулярной почечной дисфункцией) не исключена.

Эхинацея может вызвать развитие аллергических реакций у пациентов с атопическими заболеваниями.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности: 3 года.

Лекарственные препараты всегда храните в оригинальной упаковке, по истечении срока годности, отпечатанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарственные средства в канализацию или домашний мусор. Спрашивайте у своего фармацевта как избавиться от лишних лекарств. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

