

*Пантовигар*

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА  
(информация для потребителя)  
ПАНТОВИГАР**

НД РБ

Торговое название: Пантовигар

8669 - 2018


**Лекарственная форма:** капсулы

**Состав**

**1 капсула содержит:**

Активные вещества:

Дрожжи медицинские	100 мг
Тиамина мононитрат	60 мг
Кальция пантотенат	60 мг
L-Цистин	20 мг
пара-Аминобензойная кислота	20 мг
Кератин	20 мг
Вспомогательные вещества:	
Целлюлоза микрокристаллическая	25 мг
Тальк	6 мг
Магния стеарат	6 мг
Повидон К-30	4 мг
Кремния диоксид коллоидный	2 мг
Оболочка капсулы	
Желатин	62,168 мг
Вода очищенная	11,02 мг
Титана диоксид	2,128 мг
Краситель железа оксид желтый	0,580 мг
Индигокармин	0,104 мг



**Описание**

Твердые желатиновые капсулы: крышечка капсулы - темно-зеленого цвета, корпус – светло-бежевого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Витамины. Витамины в комбинации с различными веществами.

**Код ATХ: A11JC**

**Фармакологические свойства**

Пантовигар содержит необходимые для волос и ногтей элементы: Д-пантотенат кальция, L-цистин, аминокислоты, кератин. Свойства лекарственного средства обусловлены свойствами входящих в его состав компонентов.

**Показания к применению**

Применяется традиционно в качестве лекарственного средства с мягким действием при диффузном выпадении волос негормональной этиологии и ломкости ногтей.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к действующим веществам или одному из вспомогательных веществ.

**Применение в период беременности и лактации**

Исследований на животных, касающихся воздействия на беременность, развитие эмбриона/плода, родов и постнатального развития, не проводилось. Потенциальный риск для

человека неизвестен. Следует соблюдать осторожность при **использовании** данного лекарственного средства во время беременности.

8 6 6 9 - 2 0 1 8

#### **Способ применения и дозы**

Взрослые и подростки старше 12 лет принимают по 1 капсуле 3 раза в день с основным приемом пищи, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды.

Средняя длительность применения составляет 3 - 6 месяцев.

Исследования по безопасности длительного применения лекарственного средства Пантовигар не проводились.

#### **Дети**

Безопасность и эффективность лекарственного средства Пантовигар у детей младше 12 лет не подтверждена.

В виду отсутствия данных Пантовигар не рекомендован к применению у детей младше 12 лет.

#### **Побочное действие**

Аллергические реакции - кожные реакции в виде зуда и крапивницы; повышенное потоотделение, учащение пульса. Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, изжога, метеоризм, боли в области живота. В редких случаях возможно головокружение, головная боль, сердцебиение и эритема.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Исследования для установления взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились. До настоящего времени взаимодействие с другими лекарственными средствами не установлено.

#### **Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами**

Пантовигар не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

#### **Особые указания**

Отсутствуют.

#### **Форма выпуска**

По 15 капсул в блистере из поливинилхlorida и фольги алюминиевой. 6 блистеров и инструкция по медицинскому применению для пациентов упакованы в картонную пачку.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности:**

3 года. Не использовать по окончании срока годности.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Предприятие-производитель**  
«Мерц Фарма ГмбХ и Ко.КГаА»  
D-60318, Германия, Франкфурт-на-Майне

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь