

8673 - 2018  
**ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ПРОЕКТЕ ПОЛУСТАВА ДОЗЫ НА  
 ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА**

СОГЛАСОВАНО

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения  
 Республики Беларусь

от «13» 06 18 г. № 613

КЛС № 5 от 30 05 18 г.

**Листок-вкладыш (инструкция по применению для пациента)**

**Необходимо внимательно прочитать всю инструкцию по применению, так как в ней содержится важная для пациента информация.**

Данный препарат отпускается без рецепта, чтобы некоторые заболевания можно было лечить без помощи врача. Однако для достижения хороших результатов лечения, необходимо применять препарат Уросепт с осторожностью и в соответствии с информацией, приведенной в инструкции по применению.

- Необходимо сохранить эту инструкцию по применению, чтобы при необходимости можно было её повторно прочесть.
- Необходимо обратиться к врачу или к фармацевту в случае, когда нужен совет или дополнительная информация.
- Если симптомы усилияются или не пройдут, необходимо обратиться к врачу.

**УРОСЕПТ®**

таблетки покрытые оболочкой

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой голубого цвета, допускается более темное прокрашивание оболочки.

**СОСТАВ**

- 1 таблетка покрытая оболочкой содержит в качестве действующих веществ:
- густой сложный экстракт листьев березы, корня петрушки, околовплодника фасоли (*Extractum spissum compositum* (4-7 : 1) ex: *Betulae folio* 4,40 ч., *Petroselini radice* 2,66 ч., *Phaseoli pericarpio* 1,00 ч., экстрагент – метанол 90 % [v/v] ) - 86,2 мг
  - сухой экстракт травы ромашки (*Chamomillae herbae extractum siccum* (7-9 : 1), экстрагент: вода) - 8 мг
  - сухой экстракт листьев брусники (*Vitis idaeae folii extractum siccum* (3-6 : 1), экстрагент: вода) - 26 мг
  - околоплодник фасоли, порошок (*Phaseoli pericarpium*) -78 мг
  - калия цитрат (*Kalii citras*) - 19 мг
  - натрия цитрат (*Natrii citras*) -16 мг.

Вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат, сахароза, лактозы моногидрат, картофельный крахмал, магния стеарат, тальк, аравийская камедь сушенная распылением, индиготин Е 132, Capol® 1295 (смесь пчелиного белого воска Е 901 и карнаубского воска Е 903).

Фармакотерапевтическая группа (код АТХ): Прочие лекарственные средства, применяемые в урологии (G 04 BX)

**1. Что представляет собой препарат Уросепт и для чего применяется**  
 Уросепт применяется в качестве мочегонного средства в комплексной терапии инфекций мочевыводящих путей и мочекаменной болезни.

POZNAŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE  
 HERBAPOI S.A.



Применение данного лекарственного средства основано исключительно на опыте традиционного многолетнего использования.

НД РБ

8675 - 2018

## **2. Что необходимо знать перед применением препарата Уросепт**

Не следует применять препарат Уросепт при повышенной чувствительности к растениям семейства сложноцветных (*Asteraceae*, раньше *Compositae*) или к какому-либо компоненту препарата.

Уросепт противопоказан пациентам, которым необходимо ограничение потребления жидкости (например, при заболеваниях сердца и/или почек).

### **Соблюдение особой осторожности при применении препарата у особых групп пациентов**

Не рекомендуется применять препарат у детей до 12 лет ввиду отсутствия данных, подтверждающих безопасность применения.

Уросепт содержит лактозы моногидрат. Этот препарат не следует принимать пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Уросепт содержит сахарозу. Этот препарат не следует принимать пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы.

Чтобы обеспечить увеличение количества мочи, необходимо адекватное потребление жидкости во время приема препарата.

Если во время приема препарата улучшения состояния не происходит или развиваются такие симптомы, как повышение температуры, боли и нарушения при мочеиспускании, появляется кровь в моче, необходимо немедленно обратиться к врачу.

### **Прочее**

Если симптомы усилияются или не пройдут, необходимо обратиться к врачу.

### **Беременность**

Ввиду отсутствия данных, подтверждающих безопасность применения, не рекомендуется применять препарат в период беременности.

### **Кормление грудью**

Ввиду отсутствия данных, подтверждающих безопасность применения, не рекомендуется применять препарат в период кормления грудью.

### **Управление автотранспортом и обслуживание механических устройств**

Применение лекарственного препарата не влияет на способность управлять автотранспортом и обслуживать механические устройства.


### **Применение других лекарственных препаратов**

Необходимо сообщить врачу о всех принимаемых в последнее время лекарственных препаратах, даже тех, которые отпускаются без рецепта.

До настоящего времени не выявлено взаимодействий с другими лекарственными препаратами.

## **3. Как применять препарат Уросепт**

Препарат применяют внутрь 3 раза в день по 2 таблетки покрытые оболочкой, запивая стаканом воды, или в соответствии с индивидуальными рекомендациями врача.



POZNAŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE  
HERBAPO! S.A.



Под контролем врача препарат можно применять в течение более длительного времени, также в комбинации с другими препаратами.

**В случае применения препарата Уросепт в дозе большей, чем назначено**  
Неизвестны случаи передозировки препарата.

В случае применения препарата в дозе большей, чем назначено и появления беспокоящих симптомов, необходимо обратиться к врачу или фармацевту.

#### **4. Возможные побочные действия**

Как любой препарат, Уросепт может вызывать побочные действия.

В связи с присутствием в препарате экстракта корня петрушки, обладающего потенциальным фотосенсибилизирующим действием, существует незначительная вероятность возникновения кожных изменений у лиц со светлым цветом кожи при длительном пребывании на солнечном свете.

Возможно развитие аллергических реакций (зуд, сыпь, крапивница, аллергический ринит, анафилактические реакции), желудочно-кишечных расстройств (тошнота, рвота, диарея).

В случае развития побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

#### **5. Условия хранения препарата Уросепт**

Хранить при температуре не выше 25°C.

При хранении возможно появление темного прокрашивания оболочки, что не влияет на терапевтические свойства препарата.

*Препарат следует хранить в местах, недоступных и незаметных для детей.*

*Не следует применять препарат Уросепт по истечении срока годности, указанного на упаковке.*

**Срок годности:** 3 года.

**Условия отпуска:** без рецепта врача.



**Вид упаковки:** блистеры из алюминиевой фольги и пленки ПВХ (2 x 15 или 4 x 15 таблеток) в картонной пачке.

#### **Производитель:**

Познаньский завод лекарственных трав „Гербапол” А.О.

ул. Товарова 47-51, 61-896 Познань, Польша

тел.: +48 61 886 18 00; факс: + 48 61 853 60 58



61-896 POZNAŃ, ul. Towarowa 47