


8913 - 2020



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

ТЕРАФЛЕКС® ХОНДРОКРЕМ ФОРТЕ

Наименование

Терафлекс® Хондрокрем Форте, крем для наружного применения (10 мг+50 мг)/г.

Описание

Крем от светло-желтого с зеленоватым оттенком до желтого с зеленоватым оттенком цвета с запахом диметилсульфоксида.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства для наружного применения при болях в суставах и мышцах. Код АТС: M02AX10.

Состав

1 г крема содержит

действующие вещества: хондроитина сульфат натрия 50 мг, мелоксикам 10 мг;

вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, пропиленгликоль, макрогола цетостеарат, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт не более 60%, стеариловый спирт не менее 40%), парафин жидкий, вазелин, имидомочевина, натрия дисульфит, вода очищенная.

Фармакологические свойства

Терафлекс Хондрокрем Форте крем обладает комбинированным действием: оказывает обезболивающее действие, способствует увеличению объема движения суставов (в области нанесения крема), обладает противовоспалительным действием, уменьшает припухлость суставов. Благодаря оптимальному сочетанию компонентов крема отмечается взаимное усиление их обезболивающего и противовоспалительного эффектов.


Хондроитина сульфат натрия – высокомолекулярный мукополисахарид, который является естественным компонентом хрящевой ткани. Хондроитина сульфат натрия ингибирует ферменты, вызывающие поражение хрящевой ткани, тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, тем самым уменьшает боль в суставах и улучшает их подвижность.

Мелоксикам – нестероидное противовоспалительное средство, обладает противовоспалительным, анальгетическим действием. Мелоксикам избирательно ингибирует циклооксигеназу 2, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты, уменьшает в очаге воспаления количество простагландинов (медиаторов боли и воспаления). Мелоксикам является хондронейтральным препаратом, не оказывает негативного влияния на хрящевую ткань, не влияет на синтез протеогликана хондроцитами суставного хряща.

Фармакокинетика

Фармакокинетика компонентов препарата не изучалась.

8913 - 2020

**Показания к применению**

В составе комплексной терапии остеоартроза коленного сустава.

Способ применения и дозы

Наружно. Слегка втирают полоску крема длиной от 1 до 5 см, кратность применения – 2-3 раза в сутки. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. После нанесения крема руки необходимо тщательно вымыть. Длительность лечения зависит от показаний и отмечаемого эффекта.

Побочное действие

Со стороны кожи и подкожных тканей возможны: гиперемия, папулезно-везикулезные высыпания, шелушение, фотосенсибилизация, аллергические реакции (зуд и жжение кожи, многоформная эритема, крапивница).

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата (а также к другим нестероидным противовоспалительным средствам); полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВС (в т.ч. в анамнезе); нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения, детский возраст до 12 лет, период беременности и лактации.

Передозировка

Крайне низкая системная абсорбция действующих веществ при наружном применении делает передозировку практически невозможной.

Меры предосторожности

Крем следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. Не следует допускать попадания в глаза и слизистые оболочки.

Следует проконсультироваться с врачом перед совместным применением Терафлекс Хондрокрем Форте крема с другими НПВС, а также при необходимости использования препарата более 2-х недель.

Следует соблюдать осторожность при нарушении функции почек и печени, хронической сердечной недостаточности, при выраженной патологии желудочно-кишечного тракта (кровотечения желудка и 12-перстной кишки, язвенная болезнь в фазе обострения или тяжелые нарушения свертываемости крови), пожилой возраст.

В период лечения возможно развитие реакций фоточувствительности. Для уменьшения риска развития фотосенсибилизации пациентам следует избегать УФ-облучения и посещения солярия.

Входящие в состав вспомогательных веществ диметилсульфоксид и пропиленгликоль могут раздражать кожу; цетостеариловый спирт может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Беременность и лактация


Применение препарата противопоказано в период беременности и лактации.

Влияние на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами

Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

**Условия хранения**

8913 - 2020
При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска

Туба алюминиевая 30 г, 50 г или 100 г вместе с листком-вкладышем помещены в картонную коробку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Название фирмы-заявителя/производителя, адрес:

Байер Консьюмер Кэр АГ,
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

АО «Нижфарм»,
ул. Салганская, 7, Нижний Новгород, 603950, Россия