

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

- Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш лекарственного средства перед тем, как начать применение этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.
- Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует применять, строго выполняя все рекомендации, изложенные в листке-вкладыше лекарственного средства.
- Сохраните листок-вкладыш лекарственного средства. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.

НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

КАПСИКАМ®

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Международное непатентованное название: отсутствует

Описание

Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета с запахом камфоры и скипидара.

СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

1 г мази содержит:

активные вещества: 50 мг диметилсульфоксида, 30 мг камфоры рацемической, 30 мг скипидара живичного, 20 мг бензилникотината и 2 мг нонивамида;

вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт эмульгирующий (тип А), натрия цетилстеарилсульфат, полисорбат-80, бронопол и вода очищенная.

ФОРМА ВЫПУСКА

Мазь для наружного применения.

КОД КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Прочие средства для наружного применения при болях в суставах и мышцах.

Код АТС: M02AX10

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мазь КАПСИКАМ содержит вещества, обладающие местнораздражающим и вазодилатирующим действием. Местнораздражающий эффект способствует уменьшению выраженности болевых ощущений.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Симптоматическое средство при мышечных и суставных болях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Применяется наружно.

При применении мази в качестве разогревающего средства у спортсменов, на мышечную область наносят при помощи аппликатора 2-3 г мази и втирают



массирующими движениями в кожу до легкого покраснения кожи. После тренировки следует смыть мазь с кожи прохладной водой.

Для облегчения боли на болезненный участок при помощи аппликатора наносят 1-3 г мази 2-3 раза в день в зависимости от интенсивности боли.

Не применять окклюзирующих повязок.

При нанесении мази следует избегать травмирующих кожу движений.

После каждой процедуры следует вымыть руки прохладной водой с мылом.

Длительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания, однако не следует применять препарат более 10 дней без консультации врача.

Нет опыта применения препарата в педиатрии (см. раздел *Меры предосторожности*).

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Побочные действия представлены по системно-органным классам MedDRA, используя классификацию MedDRA по частоте проявления: очень часто (>1/10); часто (от >1/100 до <1/10); нечасто (от >1/1000 до <1/100); редко (от >1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); не известно (нельзя оценить по имеющимся данным).

Со стороны иммунной системы

Не известно: реакции гиперчувствительности.

Со стороны кожи и подкожной ткани

Редко: зуд.

Не известно: крапивница, отек, эритема.

Со стороны нервной системы

Не известно: жжение на коже.



При повышенной чувствительности к компонентам мази могут развиваться зуд, отек или крапивница. В этом случае рекомендуется прекратить применение мази и смыть мазь с кожи. Во избежание побочных действий рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Повышенная чувствительность к компонентам мази;
- наличие кожных заболеваний, язв или повреждение кожного покрова на участках нанесения лекарственного средства;
- склонность к судорогам, развитию бронхоспазма;
- беременность, период кормления грудью;
- детский и подростковый возраст до 18 лет.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

При нанесении на кожу большого количества мази могут возникнуть покраснение кожи, зуд или ощущение жжения. Проглатывание мази может вызывать гастроинтестинальные симптомы – рвоту и диарею. Лечение симптоматическое.

При случайном проглатывании мази в больших количествах могут возникнуть симптомы острого отравления: тошнота, рвота, боли в животе и головная боль, головокружение, ощущение тепла/жар, судороги, угнетение дыхания и кома.



В случае приема мази внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу. При тяжелых гастроинтестинальных и неврологических симптомах отравления необходимо наблюдение за пациентом и симптоматическое лечение. Нельзя вызывать рвоту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Мазь нельзя наносить на поврежденную кожу. Во избежание сильного раздражения необходимо следить, чтобы мазь не попадала на слизистые оболочки. При случайном попадании на слизистые оболочки или в глаза смыть большим количеством воды.

Незадолго до и после применения препарата не рекомендуется проводить тепловые процедуры (принятие ванны, посещение бани) в связи с увеличением риска возникновения кожных реакций.

Мазь содержит в качестве вспомогательных веществ цетостеариловый спирт эмульгирующий (тип А) и бронопол, которые могут вызывать местные кожные реакции (в том числе, контактный дерматит).

Во избежание побочных действий следует предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

Обработка больших поверхностей тела запрещается. Препарат можно применять только на чистой неповрежденной коже. При нанесении мази на кожу не должна возникать боль. В случае возникновения боли, отека или высыпаний на коже необходимо прекратить применение препарата и немедленно обратиться к врачу.

После нанесения мази не рекомендуется применять местное тепло (грелки, лампы, пакеты или бутылки с горячей водой) в связи с увеличением риска возникновения кожных реакций. Не применять окклюзирующих повязок. Избегать вдыхания.

Если при применении мази симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

Беременность и кормление грудью

Не следует применять препарат во время беременности и кормления грудью в связи с отсутствием данных о безопасности его применения в указанные периоды.

Дети и подростки

Не следует применять препарат у детей и подростков до 18 лет в связи с отсутствием достаточных данных о его применении у пациентов указанных возрастных групп.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механизмы

Влияние отсутствует.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Исследования по оценке взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились. В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Без рецепта.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь



УПАКОВКА

По 15 г, 30 г или 50 г в тубе алюминиевой с внутренней поверхностью, покрытой лаком, с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из пластмассы.
1 туба в пачке картонной вместе с инструкцией по применению и аппликатором.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ (ЗАЯВИТЕЛЕ)**ЗАЯВИТЕЛЬ (Владелец регистрационного удостоверения)**

АО «Гриндекс».

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Телефон: +371 67083205

Факс: +371 67083505

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

АО Таллиннский фармацевтический завод.

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония

Дата корректировки текста: апрель 2021 г.

