


06.05.2013



КАС №7 от 25.07.13

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

ЦИСТИВИТ

Торговое название: Цистивит

Лекарственная форма: капсулы

Состав: одна капсула содержит: клюквы экстракта сухого стандартизованного (40% проантоцианидинов) в пересчете на проантоцианидины - 36 мг, кислоты аскорбиновой - 60 мг.

Вспомогательные вещества: лецитин (Солек В-10, соевый жидкий), воск пчелиный, подсолнечное масло.

Состав оболочки капсулы: желатин, глицерин, титана диоксид, вода очищенная, натрия бензоат Е-211, красители: железа оксид красный Е-172, железа оксид черный Е-172, кармуазин Е-122.

Описание. Капсулы мягкие желатиновые овальной формы, красно-фиолетового цвета, непрозрачные, упругие, со швом.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие урологические препараты.

Код АТХ G04ВХ.

Показания к применению

Лекарственное средство Цистивит показано для профилактики и в качестве вспомогательного средства при комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей.

Способ применения и дозы

Цистивит принимают по 1 капсуле на ночь, запивая стаканом воды (после опорожнения мочевого пузыря). Длительность приема составляет от 2 до 4 недель. При необходимости курс повторяют.


При инфекциях мочевыводящих путей с болезненным мочеиспусканием и жжением во время мочеиспускания, а также после завершения курса лечения инфекций мочевыводящих путей антибиотиками следует принимать Цистивит в течение, по крайней мере, 1 месяца.

Увеличение периода применения стабилизирует достигнутый эффект.

В случае возникновения инфекций мочевыводящих путей 3 и более раз в год следует принимать Цистивит в течение 2 недель в месяц на протяжении 3 месяцев с целью профилактики.

В период менопаузы повышается значение рН влагалища, что способствует увеличению случаев инфекций мочевыводящих путей. Диабет, прием кортикостероидов, а также использование механических противозачаточных средств увеличивают риск повторного возникновения инфекций мочевыводящих путей. В случае присутствия одного или более указанных факторов прием Цистивита в течение 2 недель в месяц на протяжении 3 месяцев может помочь защитить мочевыводящие пути, создавая неблагоприятную среду для размножения микроорганизмов.

Подтверждено, что сезонные изменения погоды, влажная/жаркая погода, стресс, путешествия, плохие условия гигиены могут вызывать инфекции мочевыво-



дящих путей. Для их профилактики женщины могут принимать Цистивит в течение всего действия неблагоприятных факторов.

Особые указания

Для увеличения диуреза необходимо выпивать не менее 2 литров воды в день, особенно пациентам, страдающим мочекаменной болезнью.

Влияние на лабораторные показатели: увеличивает количество оксалатов в моче.

Пациенты, страдающие мочекаменной болезнью, перед приемом Цистивита должны проконсультироваться с врачом.

Пациенты, которым рекомендовано ограничение суточного потребления жидкости, перед приемом Цистивита должны проконсультироваться с врачом.

Прием клюквы для лечения заболеваний мочевых путей у детей не эффективен и не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Пациентам, принимающим варфарин и Цистивит, следует обратить внимание на их потенциально возможное взаимодействие с риском возникновения кровотечения. Компоненты клюквы не оказывают существенного влияния на фармакокинетику амоксициллина.

Побочное действие

Аллергические реакции: кожный зуд, кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек и др.

Передозировка

О случаях передозировки лекарственного средства не сообщалось.

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;
- беременность и период лактации.

Прием клюквы для лечения заболеваний мочевых путей у детей не эффективен и не рекомендуется.

Беременность и период грудного вскармливания

Применение препарата Цистивит во время беременности и в период кормления грудью не рекомендуется в связи с отсутствием достоверных данных о влиянии препарата на организм беременной женщины и на ребенка.

Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой

Не влияет.

Форма выпуска

Капсулы мягкие желатиновые овальной формы, красно-фиолетового цвета, непрозрачные, упругие, со швом; по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 3 контурные ячейковые упаковки в пачке.

Условия хранения

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранят в недоступном для детей месте.



Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпуск производится без рецепта врача.

Название и адрес производителя:

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26

тел./факс (+ 37517) 344-18-66

e-mail: info@mic.by, www.mic.by