



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
лекарственного средства
Гепсил-Рн®

информация для пациентов

Название лекарственного средства:

Торговое название: Гепсил-Рн®

Международное непатентованное название: Silymarin

Общая характеристика:

Таблетки, покрытые оболочкой коричневого цвета, цилиндрические, двояковыпуклые.

Состав лекарственного средства:

1 таблетка содержит:

активное вещество: сухой экстракт из плодов расторопши пятнистой эквивалентно 35 мг силимарина;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат, повидон, лактоза моногидрат; оболочка (поливиниловый спирт, макрогол, тальк, железа оксид черный, железа оксид красный, железа оксид желтый, титана диоксид).

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа:

Средства для лечения заболеваний печени.

Показания к применению:

Симптоматическое лечение хронических токсических поражений печени; для поддерживающего лечения у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями печени или циррозом печени.

Способ применения и дозы:

Таблетки принимать целиком, запивая достаточным количеством жидкости.

Если другого не предусмотрено — по 4 таблетки 3 раза в день (что эквивалентно 420 мг силимарина).

Побочное действие:

Лекарственное средство хорошо переносится. Редко можно наблюдать следующие побочные действия:

со стороны ЖКТ: тошнота, диспепсия, диарея;

со стороны кожи и подкожной жировой клетчатки: в отдельных случаях возможны кожные аллергические реакции -- зуд, сыпь;

со стороны органа слуха и равновесия: редко можно наблюдать усиление существующих вестибулярных нарушений.

Побочные действия являются проходящими и исчезают после прекращения приема лекарственного средства.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Детский возраст до 12 лет.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

При случайном приеме в высокой дозе следует вызвать рвоту, провести промывание желудка с применением активированного угля, симптоматическое лечение.

Меры предосторожности:

Прием лекарственного средства не может заменить соблюдение диеты или отказ от приема гепатотоксических веществ при поражениях печени (например, от алкоголя).

Лекарственное средство содержит в качестве вспомогательного вещества лактозу моногидрат.

Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом

лактазы Larr или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать лекарственное средство.

При применении лекарственного средства возможно проявление эстрогеноподобного действия силимарина. Поэтому пациентам с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичников, матки, предстательной железы) лекарственное средство назначают с осторожностью. В этих случаях необходима консультация специалиста.

Применение в период беременности и лактации:

В период беременности и кормления грудью лекарственное средство применяют при условии, что в результате лечения ожидаемая польза больше, чем риск его применения.

Особые указания:

В период беременности и кормления грудью лекарственное средство применяют только под контролем врача.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механические устройства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При совместном применении силимарина с пероральными контрацептивными препаратами и лекарствами, которые используются при гормональной заместительной терапии, возможно уменьшение эффектов последних.

Силимарин подавляет систему цитохрома P450 и может усиливать эффекты таких лекарств как диазепам, алпразолам, кетоконазол, ловастатин, винбластин.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от влаги и света месте.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска: Без рецепта врача.

Упаковка:

10 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

15 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 6 или 8 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Производитель:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,
тел/факс: +375 (212) 34-06-29, e-mail: secretar@rubikon.by, www.rubikon.by

