

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от «*10.10.2016* №*963*

**Березы почки,
цельное сырье 100 г в пачке
*Betulae gemmae***

Общая характеристика:

почки удлиненно-конические, заостренные или притупленные, часто клейкие. Цвет коричневый, у основания иногда зеленоватый. Запах бальзамический.

Березы почки содержат эфирное масло, аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, флавоноиды, жирные кислоты (линовую, линоленовую и др.), смолистые вещества и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Цельное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, применяемые для лечения урологических заболеваний.

Фармакологические свойства. Настой березы почек обладает диуретическим действием.

Показания к применению. Внутрь: в составе комплексной терапии в качестве диуретического средства при заболеваниях мочевыводящих путей легкой степени тяжести.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 10 г (1/2 столовой ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутрь в теплом виде по 1/3 стакана 2–3 раза в день за 10–15 минут до еды.

Продолжительность приема определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендуется из-за отсутствия достаточных данных.

Применение во время беременности и кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с

отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились.

Побочное действие. Возможно развитие нарушений желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея) и аллергических реакций (зуд, сыпь, крапивница, аллергический ринит). При длительном применении препарат может вызвать раздражение почечной паренхимы и обострение воспалительных заболеваний почек. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Повышенная чувствительность, включая гиперчувствительность к пыльце бересклета или другим растительным компонентам. Гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность. Заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца или почек).
Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Передозировка. Не наблюдалась. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Чтобы обеспечить увеличение количества мочи необходим адекватный прием жидкости в процессе лечения. Настой почек бересклета следует принимать с осторожностью, под контролем анализов мочи. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, появляются нарушения мочеиспускания, боль, кровь в моче), необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не изучалось. Перед совместным приемом с другими лекарственными средствами необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре 15⁰С–25⁰С. Приготовленный настой при температуре от 8⁰С до 15⁰С – не более 2 суток.

Срок годности. 2 года. Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел.8(0152) 94-17-72.

