



## ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ

(информация для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного препарата  
**ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА**

**Торговое название:** Женьшена настойка.

**Международное непатентованное название:** отсутствует.

**Форма выпуска:** настойка.

**Состав:** спиртовое извлечение из корней женьшения 1:10. Содержит не менее 67 % этианола.

**Описание:** прозрачный раствор от желтоватого до коричневого с красноватым оттенком цвета со слабым специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** общетонизирующие средства.

**Код АТХ:** A13A.

### Фармакологические свойства

Фармакологическая активность обусловлена содержанием сапониновых гликозидов-гинсенозидов (панаксозиды А и В, панаквилон, панаксин), эфирных и жирных масел, стеролов, пептидов, витаминов и минералов. Стимулирует центральную нервную систему, повышает артериальное давление, умственную и физическую работоспособность, стимулирует аппетит, стимулирует половую функцию.

Снижает содержание глюкозы в крови, активирует деятельность надпочечников.

НД РБ

0466Б - 2017

## Показания к применению

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

В комплексной терапии астенических состояний, сниженной умственной и физической работоспособности, эректильной дисфункции неврастенического генеза. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

### Способ применения и дозы

Внутрь, за 30–40 мин до еды.

Применяют по 15–20 капель настойки 2–3 раза в день в течение 30–40 дней. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного препарата и достигнутого эффекта. Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола.

*Особенности применения у пожилых пациентов:* не изучены.

*Особенности применения у лиц с нарушенной функцией почек:* не изучены.

*Особенности применения у лиц с нарушенной функцией печени:* с осторожностью.

### Побочное действие

*Со стороны пищеварительной системы:* боли в животе, тошнота, рвота, диарея, запор.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* повышение артериального давления, тахикардия.

*Со стороны центральной нервной системы:* головная боль, нервозность, бессонница.

*Прочие:* аллергические реакции, носовое кровотечение, гипогликемия.

*В случае возникновения побочных реакций, в том числе, не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного препарата и обратиться к врачу.*

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата

рата, артериальная гипертензия, тахикардия, повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, алкоголизм, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога, бессонница, кровоточивость, острые инфекционные заболевания, хронические заболевания печени, цирроз печени, детский возраст до 18 лет, беременность, период лактации.

### **Меры предосторожности**

Не следует применять во второй половине дня во избежание нарушения сна.

Лекарственный препарат содержит не менее 67 об. % этилового спирта, то есть 317,29–423,05 мг на разовую дозу (15–20 капель), что равно 8,04–10,72 мл пива, 3,35–4,47 мл вина на дозу. Вреден для лиц с алкоголизмом.

Настойка противопоказана пациентам с заболеваниями печени, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога, беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет.

Если во время приема лекарственного средства в течение 2 недель симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Пациентам с сахарным диабетом перед приемом лекарственного препарата следует проконсультироваться с врачом, так как прием настойки женьшеня может привести к небольшому снижению уровня глюкозы в крови.

### **Применение во время беременности и в период лактации**

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

### **Применение у детей**

В связи с отсутствием достаточных данных лекарственный препарат не рекомендовано для назначения детям и подросткам до 18 лет.

**Влияние на способность к управлению авт от транспортом и другими потенциально опасными механизмами**

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков. Проявляет антагонизм с лекарственными препаратами, угнетающими центральную нервную систему (противоэпилептические лекарственные препараты, антипсихотические препараты, анксиолитики, седативные лекарственные препараты).

Усиливает эффект гипогликемических лекарственных препаратов.

Усиливает действие варфарина.

Повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

Соблюдать осторожность в случае необходимости одновременного приема с ингибиторами МАО.

*Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:* необходимо избегать совместного приема лекарственных препаратов, вызывающих дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем (дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксиф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид, гризофульвин, производные нитро-5-имидазола (метронидазол, орнидазол, тинидазол), кетоконазол, прокарбазин). Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных препаратов, содержащих этиловый спирт.

*В случае одновременного приема других лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.*

**Передозировка**

*Симптомы:* повышение артериального давления, бессонница.

В случае передозировки необходимо прекратить прием лекарственного препарата и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка.

**Лечение:** симптоматическое.

**Упаковка**

30 мл или 50 мл во флаконах из стекла. Один флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (№1).

**Хранение**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня.

**Срок годности**

3 года. Не использовать после окончания срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Информация о производителе**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь