


Листок-вкладыш – информация для пациента**Форжект, 10 г, порошок для приготовления раствора
для приема внутрь в пакетах**

Действующее вещество: макрогол

- Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует немедленно обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Форжект и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Форжект.
3. Прием препарата Форжект.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Форжект.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Форжект и для чего его применяют**

Препарат Форжект содержит действующее вещество макрогол 4000 (полиэтиленгликоль). Форжект относится к группе препаратов, которые называются осмотически действующие слабительные средства. Он увеличивает количество воды в кале, что делает его мягче и облегчает опорожнение кишечника.

Препарат Форжект показан для симптоматического лечения запоров у взрослых и детей старше 8 лет. Лечение запора следует сочетать с соблюдением диеты и здорового образа жизни.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Длительность лечения запора у детей не должна превышать 3 месяцев.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Форжект**Сведения, необходимые перед приемом препарата**Случайный запор

Он может быть связан с недавним изменением в рационе питания и образе жизни. Существуют лекарственные препараты, которые могут использоваться для краткосрочного лечения. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом в случае недавнего запора, причиной которого не являлись изменения в образе жизни, или запор, сопровождающийся болями, температурой или вздутием живота.

Хронический запор (долговременный запор)

Возможные причины:



- заболевание кишечника, которое требует консультации врача;
- дисфункция кишечника (нарушение работы кишечника) как результат изменений в рационе питания и образе жизни.

Лечение включает в себя среди прочего:

- увеличение потребления клетчатки в рационе (овощи, хлеб, фрукты);
- увеличение потребления воды и фруктового сока;
- повышение физической активности (занятия спортом, ходьба и т. д.);
- восстановление рефлекса дефекации.

Не принимайте препарат Форжект

- если у Вас аллергия на макрогол (полиэтиленгликоль) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас выраженное воспалительное заболевание кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), токсический мегаколон в сочетании с симптоматическим стенозом;
- если у Вас перфорация кишечника или риск перфорации;
- если у Вас есть или Вы подозреваете, что у Вас кишечная непроходимость;
- если у Вас абдоминальные боли (т. е. боли в животе) по неопределенной причине;
- если Ваш возраст не достиг 8 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Форжект проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Перед применением препарата у детей проконсультируйтесь с лечащим врачом, чтобы убедиться в отсутствии органических причин запора. После 3 месяцев лечения Ваш лечащий врач должен оценить клиническое состояние Вашего ребенка.

В случае возникновения диареи необходимо обратить особое внимание на пациентов, склонных к нарушениям водно-электролитного баланса (т.е. пожилых, пациентов с нарушением функции печени и почек или пациентов, принимающих диуретики), необходим контроль уровня электролитов в крови.

Препарат Форжект содержит макрогол (полиэтиленгликоль). В очень редких случаях наблюдались реакции гиперчувствительности (сыпь, крапивница или отек).

Другие препараты и препарат Форжект

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе безрецептурные лекарственные препараты.

Возможно временное снижение всасывания других лекарственных препаратов во время применения препарата Форжект; в частности, это может произойти с препаратами с узким терапевтическим индексом или коротким периодом полувыведения, такими как дигоксин, противоэпилептические препараты, кумарины и иммунодепрессанты, что может снизить их эффективность.

Препарат Форжект с пищей, напитками и алкоголем

Прием препарата Форжект рекомендуется в утренние часы (1-2 пакета) вне зависимости от приема пищи. Количество жидкости не ограничивается.

Употребление алкоголя во время лечения не рекомендуется.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность



Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Так как системное воздействие на организм у макрогола крайне незначительно, побочных эффектов при его применении у беременных не ожидается.

Форжект может применяться во время беременности.

Нет данных о выделении макрогола 4000 в грудное молоко. Форжект может применяться в период кормления грудью.

Учитывая незначительную абсорбцию макрогола 4000, препарат не оказывает влияния на способность к воспроизводству потомства.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Форжект не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и потенциально опасными механизмами.

Форжект содержит натрий

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 1 пакет, т. е., по сути, не содержит натрия.

Важная информация о некоторых компонентах препарата Форжект

Форжект не содержит сахар или полиол, поэтому может назначаться пациентам с сахарным диабетом, а также лицам, которые находятся на безгалактозной диете.

3. Прием препарата Форжект

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки, или медицинской сестры.

При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, или медицинской сестрой.

Препарат Форжект можно применять только у пациентов старше 8 лет. Препарат предназначен для приема внутрь.

Рекомендуемая доза

Суточную дозу препарата (1-2 пакета) рекомендуется принимать внутрь утром в один прием. Содержимое каждого пакета необходимо растворить в стакане воды непосредственно перед приемом. Суточная доза может изменяться в соответствии с клиническим эффектом, она может колебаться от одного пакета в сутки (особенно у детей) до 2 пакетов в сутки.

Слабительный эффект препарата Форжект наступает в течение 24-48 часов после приема.

Продолжительность лечения определяют индивидуально. При временных запорах (в т.ч. связанных с оперативным вмешательством или путешествием) рекомендуют кратковременное применение препарата.

Продолжительность лечения у детей не должна превышать 3 месяцев, учитывая недостаточное количество клинических данных о приеме препарата более длительный срок.

Улучшение моторики кишечника, достигнутое с помощью препарата Форжект, следует поддерживать соблюдением здорового образа жизни и диеты.

Если Вы приняли препарата Форжект больше, чем следовало

Передозировка может вызвать диарею, которая проходит при временном прекращении лечения или при уменьшении дозировки.



Чрезмерная потеря жидкости при диарее или рвоте может потребовать восстановления баланса при электролитных нарушениях (например, низкого уровня натрия и калия в крови). Для этого необходимо обратиться к своему врачу с целью контроля состояния и получения рекомендаций по изменению терапии (прекращение лечения препаратом или уменьшение дозировки) и коррекции электролитного баланса.

Если вы забыли принять препарат Форжект

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Форжект может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат может вызвать другие, нежели указанные ниже нежелательные реакции.

У взрослых

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- вздутие живота
- боли в животе
- понос (диарея)
- тошнота

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- рвота
- неотложные позывы к дефекации
- недержание кала

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- нарушения электролитного баланса (гипонатриемия, гипокалиемия) и/или дегидратация (особенно у пожилых пациентов)
- реакции гиперчувствительности: крапивница, кожная сыпь, кожный зуд, эритема, отек Квинке, анафилактический шок

У детей

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- боли в животе;
- диарея.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):


- вздутие живота;
- рвота и тошнота.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- реакции гиперчувствительности: крапивница, кожная сыпь, кожный зуд, отек лица, отек Квинке, анафилактический шок.

Применение больших дозировок может вызывать диарею, которая как правило, проходит при уменьшении дозировки или при временном прекращении лечения. Диарея может стать причиной болезненности перианальной зоны.

Сообщение о нежелательных реакциях



Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже).

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29;

факс: +375 (17) 242 00 29.

<https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Форжект

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не используйте препарат по истечении срока годности 2 года, указанного на картонной пачке и пакете. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца. Не применяйте препарат, если Вы заметили повреждение пакета из алюминиевой фольги.

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25°C.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Форжект содержит в одном пакете:

- действующим веществом является макрогол 4000 - 10000 мг;
- вспомогательными веществами являются сахарин натрий, ароматизатор «Вишня».

Внешний вид препарата Форжект и содержимое упаковки

Белый или почти белый порошок с запахом вишни для приготовления раствора для приема внутрь.

По 10 г в пакете из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги. 10 пакетов с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ»

220141, г. Минск, ул. академика В.Ф. Купревича, д. 5, корп. 3, Республика Беларусь,

тел./факс 8(017) 268-63-64

info@academpharm.by

Листок-вкладыш пересмотрен