

Листок-вкладыш – информация для потребителя
ГИДРОКОРТИЗОН, мазь, 10 мг/г
Действующее вещество: Hydrocortisone

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 2108 от 2013 г. № 834

Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ГИДРОКОРТИЗОН, и для чего его применяют
2. О чём следует знать перед применением препарата ГИДРОКОРТИЗОН
3. Применение препарата ГИДРОКОРТИЗОН
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ГИДРОКОРТИЗОН
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат ГИДРОКОРТИЗОН,
и для чего его применяют**


Гидрокортизон, мазь для наружного применения, – это однородная мазь белого с желтоватым оттенком или светло-желтого цвета, предназначенная для применения только на коже. Она содержит гидрокортизон, который относится к одной из групп лекарственных препаратов, – кортикостероидам.

Мазь гидрокортизона применяется для облегчения зуда и воспаления при таких заболеваниях кожи как экзема (легкой и умеренной степени тяжести), аллергический и контактный дерматит, нейродермит, реакции кожи на укусы насекомых.

**2. О чём следует знать перед применением
препарата ГИДРОКОРТИЗОН**

Не применяйте ГИДРОКОРТИЗОН:

- Если у Вас аллергия на гидрокортизон или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- Если у Вас есть бактериальная инфекция (например, пиодермия), вирусная инфекция (например, простой герпес, ветряная оспа или опоясывающий герпес), грибковая инфекция (например, опоясывающий лишай, стригущий лишай или молочница) или паразитарная инфекция (например, чесотка);
- Если у Вас развились нежелательные реакции, связанные с применением глюкокортикоидов;
- Если у Вас ихтиоз, ювенильный подошвенный дерматоз, обыкновенные или розовые угри, новообразования кожи, ломкость сосудов кожи или атрофия кожи;
- На участках с язвенными поражениями и ранами кожи;
- ГИДРОКОРТИЗОН противопоказан детям младше 2-х лет.



Особые указания и меры предосторожности

Применяйте с осторожностью при сахарном диабете.

Не покрывайте область нанесения мази повязкой любого вида после применения препарата ГИДРОКОРТИЗОН

Будьте очень осторожны, применяя мазь у детей в связи с чувствительной тонкой кожей.

Лечение детей не должно превышать 7 дней.

Применение препарата у детей до 2-х лет противопоказано!

Не рекомендуется наносить мазь на кожу лица и анально-генитальной области. Страйтесь избегать попадания мази в глаза, не наносите мазь на веки из-за возможного попадания мази на конъюнктиву, что повышает риск развития нарушений со стороны зрения.

Если состояние не улучшается, наблюдается ухудшение существующих симптомов или появление новых, следует проконсультироваться с врачом.

Риск развития системных нежелательных реакций увеличивается при длительном лечении, нанесении на большую площадь, использовании в области кожных складок, применении окклюзионной повязки (повязки, которая препятствует свободной циркуляции воздуха в области нанесения препарата).

Применяйте препарат с особой осторожностью, если у Вас псориаз.

Другие препараты и препарат ГИДРОКОРТИЗОН

Сообщите лечащему врачу, если Вы получаете, недавно получали или собираетесь применять любые другие препараты. Также это относится к любым препаратам, которые Вы купили без назначения врача.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не следует применять препарат во время беременности без назначения врача. Существует очень небольшой риск появления аномалий у плода при использовании препарата ГИДРОКОРТИЗОН во время беременности.

Если вы кормите грудью, не наносите препарат на область молочных желез.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат ГИДРОКОРТИЗОН не влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами, требующими повышенной концентрации внимания.

3. Применение препарата ГИДРОКОРТИЗОН

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с информацией в листке-вкладыше. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат ГИДРОКОРТИЗОН предназначен только для наружного использования.

Не превышайте указанную дозу.

Применение препарата у детей младше 2-х лет противопоказано. Не применяйте ГИДРОКОРТИЗОН у детей младше 10 лет без консультации врача.

При использовании препарата у детей следует соблюдать осторожность, потому что детская кожа более тонкая и чувствительная, в связи с чем риск развития серьезных нежелательных реакций выше, чем у взрослых. Общая продолжительность лечения детей не должна превышать 7 суток, площадь обрабатываемого участка кожи не должна превышать 20% площади поверхности тела.

Для нанесения только на поверхность кожи:

1. Перед использованием тщательно помойте руки.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Беларусь
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 10 марта 2011 года № 10
«День не
более одной недели. Мягко вотрите мазь в пораженный участок, чтобы помочь коже ее впитать.

2. Наносите мазь экономно на пораженный участок от **одного до трех раз в день не более одной недели**. Мягко вотрите мазь в пораженный участок, чтобы помочь коже ее впитать.
3. После нанесения мази **не покрывайте** обработанный участок повязкой.
4. После использования мази тщательно помойте руки.

Если по ошибке Вы использовали больше препарата чем следовало, а также в случае его случайного проглатывания, следует проконсультироваться с врачом.

Если Вы забыли нанести мазь в положенное время, это следует сделать как можно скорее, не следует использовать двойную дозу для компенсации пропущенной.

Прежде чем прекратить применение препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Если состояние не улучшилось или ухудшилось после 7 дней применения препарата ГИДРОКОРТИЗОН, проконсультируйтесь с врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ГИДРОКОРТИЗОН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При возникновении следующих нежелательных реакций прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к лечащему врачу.

• Аллергическая реакция (например, кожная сыпь, красная или зудящая кожа, отек губ, глаз, языка или затруднение дыхания, ухудшение состояния, которое Вы лечите).

Редко наблюдалось раздражение кожи или зуд в месте нанесения мази, увеличение роста волос, изменение цвета кожи, истончение и легкая ранимость кожи, замедленное заживление ран, расширение сосудов кожи, появление обычных или розовых угрей, развитие инфекции.

В очень редких случаях сообщалось о развитии аллергических реакций, а также о повышении внутриглазного давления и нарушениях зрения (как правило, при использовании в области глаз).

При длительном использовании, нанесении на большие участки кожи, применении окклюзионных повязок возможно нарушение функции надпочечников, увеличение веса, округление лица, повышение уровня глюкозы в крови, повышение артериального давления.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ГИДРОКОРТИЗОН

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Храните препарат при температуре от 8 °C до 15 °C.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Республики Беларусь

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

Храните препарат в оригинальной упаковке (по 10 г в тубах алюминиевых). Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона). Срок годности: 2 года 6 месяцев.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выливайте (не выбрасывайте) препарат в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Действующим веществом препарата ГИДРОКОРТИЗОН является гидрокортизона ацетат.

Прочими вспомогательными веществами являются парафин мягкий белый, ланолин, пентол, стеариновая кислота, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), вода очищенная.

Внешний вид препарата ГИДРОКОРТИЗОН и содержимое упаковки

ГИДРОКОРТИЗОН – мазь белого с желтоватым оттенком или светло-желтого цвета; по 10 г в тубах алюминиевых. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com

Листок-вкладыш пересмотрен:

