


Листок-вкладыш
(информация для пациента)

Пастушьей сумки трава

Bursae pastoris herba



МНН. Отсутствует.

Регистрационный номер _____

Пастушьей сумки трава содержит пептиды окситоциноподобного действия, флавоноиды, амины, (холин, ацетилхолин, тирамин), инозит, дубильные вещества, органические кислоты (бурсовую, фумаровую, яблочную, лимонную и винную), витамины С, К, каротиноиды, фитонциды, эфирное масло.

Состав. Пастушьей сумки трава, измельченное сырье.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, стимулирующие тонус и сократительную активность миометрия.

Показания к применению. В составе комплексной терапии для уменьшения интенсивности обильных менструальных кровотечений у женщин с регулярным менструальным циклом после консультации врача.

Применение основано исключительно на опыте традиционного многолетнего использования.

Противопоказания. Гиперчувствительность. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозировка. 10 г (2 столовые ложки) измельченной травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1 столовой ложке 4 – 5 раз в день через 30 минут после еды. Рекомендовано начинать прием настоя за 3-5 дней до начала менструации и продолжать прием во время менструального кровотечения

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие. Аллергические реакции. Прием большого количества настоя может вызвать сердцебиение.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием настоя и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не изучалось.

Передозировка. При длительном применении – гиперкоагуляция, снижение АД. Прием

настоя следует прекратить и обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Меры предосторожности. Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача с целью исключения других гинекологических заболеваний. Необходимо соблюдать осторожность при назначении лекарственного средства пациентам с мочекаменной болезнью, гиперкоагуляцией, тромбоэмболией в анамнезе.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой. Информация отсутствует.

Особенности применения. Настой принимают внутрь в теплом виде через 30 минут после еды.

Срок годности. 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °С до 15 °С не более 2 суток.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 50 г или 100 г в пачке картонной с внутренним бумажным пакетом.

Производитель. ООО «Калина».

Адрес. Республика Беларусь,
211019 Витебская обл.,
Оршанский р-н, д. Пищалово.
Тел: (0216) 54-81-68.