


НД РБ
2108 - 2018

**Инструкция для специалистов по
медицинскому применению препарата
Лив.52®**

Торговое название:

Лив.52®



Лекарственная форма:

Таблетки

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки зеленовато-серого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета

Состав:

Каждая таблетка содержит активные ингредиенты (порошки):

Каперсов колючих корней	(Capparis spinosa auct.non. L.)	65,0 мг
Цикория обыкновенного семян	(Cichorium intybus L.)	65,0 мг
Паслена черного целого растения	(Solanum nigrum L.)	32,0 мг
Терминалии аржуна коры	(Terminalia arjuna ((Roxb.) Bedd.)	32,0 мг
Кассии западной семян	(Cassia occidentalis L.)	16,0 мг
Тысячелистника обыкновенного травы	(Achillea millefoliumL.)	16,0 мг
Тамарикса галльского целого растения	(Tamarix gallica L.)	16,0 мг
Железа (III)оксида	(Ferrum oxidum)	33,0 мг

которые обработаны над паром экстракта смеси следующего растительного сырья: *Eclipta alba* Hassk. (Эклипты белой целого растения), *Phyllanthus amarus* Schum.et.Thonn (Филантуса нирури целого растения), *Boerhaavia diffusa* L. (Берхавии раскидистой корней), *Tinospora cordifolia* Miers (Тиноспоры сердцелистной стеблей), *Raphanus sativus* L. (Редьки посевной корнеплодов), *Emblica officinalis* Gaertn. (Эмблики лекарственной плодов), *Plumbago zeylanica* L. (Свинчатки цейлонской корней), *Embelia ribes* Burm.f. (Эмбелии смородиновой плодов), *Terminalia chebula* Retz. (Терминалии хебулы кожуры плодов), *Fumaria officinalis* L. (Дымянки лекарственной целого растения).

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, натрия кроскармеллоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, магния стеарат.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие лекарственные средства.

Код АТХ: V03AX.

Фармакологические свойства

Аюрведическое средство. Использование по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Фармакокинетические свойства

Данные отсутствуют

Область применения

Аюрведическое средство применяется после консультации врача в качестве симптоматического средства в комплексной терапии функциональных расстройств, связанных с заболеваниями печени, таких как вздутие живота, метеоризм, потеря аппетита, в период реконвалесценции.

Использование по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Режим дозирования и способ применения

Взрослые: Принимать по 2 таблетки 2-3 раза в сутки за 15-30 минут до еды с небольшим количеством воды. Продолжительность приема определяется врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Желчнокаменная болезнь.

Острая патология печени.

Нарушения обмена железа.

Беременность и период грудного вскармливания.

Детский возраст до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

С осторожностью назначают пациентам с острыми заболеваниями желудка и кишечника.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у лиц с нарушенной функцией печени и почек

Лекарственное средство противопоказано пациентам с желчнокаменной болезнью и острой патологией печени.

Беременность и кормление грудью

Лекарственное средство противопоказано для приема беременным и кормящим женщинам.

Применение у детей

Лекарственное средство не предназначено для применения у детей до 18 лет.


Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие формы взаимодействия

Лив.52 снижает концентрацию ибупрофена в крови, возможно благодаря замедлению всасывания. Препарат снижает биодоступность тетрациклина и доксициклина. Сообщите врачу обо всех принимаемых лекарственных средствах, включая аюрведические.

Нежелательные реакции

Возможны аллергические реакции, диспепсические нарушения; редко – послабление стула у пациентов с нарушением процессов пищеварения и абсорбции и/или диареей в анамнезе и индивидуальная непереносимость.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.



Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае передозировки обратитесь к врачу. Лечение симптоматическое.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами или потенциально опасными механизмами

Данные относительно влияния Лив.52 на способность управлять автомобилем и работать с механизмами отсутствуют.

Форма выпуска

Таблетки по 100 расфасованы в пластиковый флакон с навинчиваемой крышкой.

Горлышко флакона дополнительно затянуто алюминиевой фольгой. Каждый флакон с инструкцией по применению помещен в картонную пачку

Условия хранения

Хранить при температуре от + 10 до + 30 °С в защищенном от влаги, недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

“Хималайя Драг Ко”, Макали, Бангалор 562 162, Индия.

www.himalayawellness.com

® Зарегистрированный товарный знак

Владелец товарных знаков: "Хималайя Глобал Холдингс Лтд".

