

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

**Листок-вкладыш**  
(информация для пациента)


**КРУШИНЫ КОРА**  
**Frangulae cortex**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

**Общая характеристика.** Крушины кора содержит оксиметилантрахиноны: глюкофрангулин, франгулин, франгулаэmodин; хризофановую кислоту, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

**Состав.** Крушины кора, измельченное сырье.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье 50 г и 100 г в пачке.



**Код классификации.** A06AB07. Слабительные средства контактного действия.

**Фармакологические свойства.**

Отвар коры крушины оказывает слабительное действие.

**Показания к применению.** Внутрь: кратковременное применение при эпизодических запорах. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность, хронические запоры, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, кровотечения, синдром острого живота, аппендицит, стеноз и атония кишечника, воспалительные заболевания толстой кишки (например, язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона), другие воспалительные процессы в брюшной полости, острые лихорадочные состояния, обезвоживание организма и нарушение баланса электролитов, геморрой, нефрит, метrorragia, беременность, лактация, детский возраст до 12 лет.

**Способ применения и дозировка.** 20 г (2 столовые ложки) коры помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана отвара, дети старше 12 лет – по 1/4 - 1/3 стакана отвара на ночь, можно разделить указанную дозу на два приема (утром и на ночь). Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

**Побочное действие.** Аллергические реакции. Дискомфорт и боли в животе спастического характера, что может потребовать снижения дозы. В случае передозировки могут развиваться коликообразные боли в животе, тенезмы, жидкий, водянистый стул. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка.** Однократная передозировка может привести к появлению болей в животе спастического характера, кишечной колики, жидкого водянистого стула. Длительное злоупотребление слабительными средствами может привести к электролитному дисбалансу (гипокалиемия и гипокальциемия), метаболическому ацидозу, нарушению всасывания питательных веществ, потере веса, альбуминурии и гематурии. Слабость и ортостатическая гипотензия могут усиливаться у пациентов пожилого возраста при повторном применении слабительных средств. По-

сле длительного приема отвара коры крушины могут развиться водно-электролитные нарушения, гипокалиемия, нарушение функции сердца, мышечная слабость, особенно при одновременном приеме сердечных гликозидов, диуретиков, кортикоステроидов или препаратов корня солодки. При длительном применении больших доз может развиться токсический гепатит. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение передозировки должно включать возмещение потери жидкости и электролитов. Следует контролировать электролиты крови, особенно калий, что особенно важно у лиц пожилого возраста.

### СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ускоренное регистрационное  
Приказ Министерства здравоохранения  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Ускоренное регистрационное со-  
держимого может привести к снижению всасывания принимаемых гликозидов (дигоксин, препарата наперстянки, строфантин). Гипокалиемия в результате длительного злоупотребления слабительными средствами также может влиять на эффекты антиаритмических средств (например, хинидина), лекарственных средств, вызывающих удлинение интервала QT. Одновременное применение диуретиков, кортикостероидов, корня солодки повышает вероятность развития электролитных нарушений (гипокалиемия).

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Меры предосторожности.** Отвар коры крушины может применяться только, если необходимый эффект не получен за счет изменения рациона питания или использования слабительных средств, увеличивающих объем кишечного содержимого. Отвар коры крушины не должен приниматься непрерывно в течение более 1-2 недель в связи с риском развития электролитного дисбаланса. Использование слабительных средств стимулирующего действия более 2 недель требует медицинского наблюдения. Длительный прием может привести к дисфункции толстой кишки (атонии) и усугублению запора. Злоупотребление слабительными средствами приводит к диарее, нарушениям водно-электролитного баланса (главным образом, гипокалиемия), что может вызвать развитие альбуминурии, гематурии, сердечной и нервно-мышечной дисфункции. Кора крушины не должны принимать пациенты с болями в животе, тошнотой или рвотой. Кровотечение из прямой кишки или отсутствие дефекации после приема слабительного средства может указывать на наличие серьезного заболевания. Отдельные составляющие коры крушины выводятся через почки, и цвет мочи может становиться оранжевым, что не является клинически значимым, но может оказывать влияние на результаты лабораторных анализов мочи. При длительном приеме может развиться пигментация слизистой оболочки толстой кишки (псевдомеланоз, который обычно проходит после прекращения приема лекарственного средства). Если во время применения отвара запор сохраняется, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

### Применение во время беременности и кормления грудью.

Лекарственное средство противопоказано во время беременности и кормления грудью.

### Применение у детей.

Применение у детей до 12 лет противопоказано.

**Влияние на способность вождения автомобиля и работу с техникой.** Информация отсутствует.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар – при температуре от 8 °C до 15 °C не более 2 суток.

**Срок годности.** 5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Без рецепта врача.

**Упаковка.** По 50 г или 100 г в пачке картонной с внутренним бумажным пакетом. Предусмотрено вложение листка-вкладыша в пачку.

**Производитель.** ООО «Калина».

**Адрес.** Республика Беларусь  
211019, Витебская область,  
Оршанский район,  
д. Пищалово

**Телефон.** (0216) 54-81-68

**СОГЛАСОВАНО**  
**МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**Приказ Министерства здравоохранения**  
**Республики Беларусь**