


Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Листок-вкладыш
(информация для пациента)

ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ ТРАВА
ABSINTHII HERBA



МНН. Отсутствует.

Регистрационный номер _____

Общая характеристика. Полыни горькой трава содержит горечь (абсинтин), эфирное масло, сесквитерпеновые лактоны, флавоноиды, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Состав. Полыни горькой трава, измельченное сырье.

Форма выпуска. Измельченное сырье 50 г или 100 г в пачке.

Описание. Цветочные корзинки, кусочки стеблей и листьев различной формы, проходящие сквозь сито (5600). В сырье видны кусочки листовой пластинки зеленовато-серого или серебристо-серого цвета, покрытые многочисленными прижатыми волосками; кусочки слегка ребристых войлочнопущенных зеленовато-серых стеблей, обычно в продольном сечении, с беловатой рыхлой сердцевинкой; кусочки цветочных корзинок, покрытых черепитчатой оберткой, листочки которой опушены прижатыми волосками; кусочки беловатого цветоложа, покрытого чешуйчатыми пленками; отдельные трубчатые и воронковидные цветки желтого цвета. Запах ароматный, сильный, своеобразный.


Фармакотерапевтическая группа. Лекарственные средства для повышения аппетита.

Фармакологические свойства. Средство растительного происхождения. Настой полыни горькой травы усиливает секрецию желудочного сока, оказывает желчегонное действие, способствует повышению аппетита.

Показания к применению. *Внутрь:* в комплексной терапии функциональных расстройств пищеварительного тракта (отсутствие аппетита, диспепсия).
Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к лекарственному средству, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет; эпилепсия, повышенная желудочная секреция, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, язвенный колит, рефлюкс-эзофагит, острый холецистит, обструкция желчевыводящих путей, холангит, заболевания печени.

Способ применения и дозировка. 3 г (1 столовая ложка) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.



Принимают внутрь 2 раза в день по 1/3 стакана при отсутствии аппетита за 30 минут до еды, при диспепсии – после еды.

Продолжительность приема определяется врачом индивидуально с учетом характера заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие. Аллергические реакции при повышенной индивидуальной чувствительности. При длительном применении может вызвать изжогу, гастралгию, тошноту, рвоту, диарею. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием настоя и обратиться к врачу.

Передозировка. При передозировке оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему (головная боль, головокружение, тремор, судороги, галлюцинации). В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

Применение во время беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Прием препаратов травы полыни может повлиять на эффекты лекарственных средств, действующих через GABA рецепторы. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности. Пациентам с желчнокаменной болезнью и заболеваниями желчевыводящих путей перед приемом лекарственного средства необходимо проконсультироваться с врачом. Не следует принимать лекарственное средство более 2 недель. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния необходимо обратиться к врачу.

Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой. Прием лекарственного средства может повлиять на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. В случае возникновения нарушений со стороны нервной системы пациентам не следует управлять автотранспортом и работать с движущимися механизмами.

Условия и срок хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °С до 15 °С не более 2 суток.

Срок годности. 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 50 г и 100 г в пачке картонной с внутренним бумажным пакетом. Предусмотрено вложение листка-вкладыша в пачку.

Производитель. ООО «Калина».

Адрес. Республика Беларусь,
211019, Витебская область,
Оршанский район, д. Пищалово
Тел. (0216) 54-81-68