


Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Инструкция

по медицинскому применению лекарственного средства
(информация для специалиста)



ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ ТРАВА ABSINTHII HERBA

МНН. Отсутствует.

Регистрационный номер _____

Общая характеристика. Цветочные корзинки, кусочки стеблей и листьев различной формы, проходящие сквозь сито (5600). В сырье видны кусочки листовой пластинки зеленовато-серого или серебристо-серого цвета, покрытые многочисленными прижатыми волосками; кусочки слегка ребристых войлочнопущенных зеленовато-серых стеблей, обычно в продольном сечении, с беловатой рыхлой сердцевинкой; кусочки цветочных корзинок, покрытых черепитчатой оберткой, листочки которой опушены прижатыми волосками; кусочки беловатого цветоложа, покрытого чешуйчатыми пленками; отдельные трубчатые и воронковидные цветки желтого цвета. Запах ароматный, сильный, своеобразный.

Полыни горькой трава содержит горечь (абсинтин), эфирное масло, сесквитерпеновые лактоны, флавоноиды, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Состав. Полыни горькой трава, измельченное сырье.

Форма выпуска. Измельченное сырье 50 г или 100 г в пачке.

Код классификации. А15. Лекарственные средства для повышения аппетита.

Фармакологические свойства. *Фармакодинамика.* Средство растительного происхождения. Настой полыни горькой травы усиливает секрецию желудочного сока, оказывает желчегонное действие, способствует повышению аппетита.

Фармакокинетика. Данные отсутствуют, лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества.

Показания к применению. *Внутрь:* в комплексной терапии функциональных расстройств пищеварительного тракта (отсутствие аппетита, диспепсия).


Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозировка. 3 г (1 столовая ложка) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь 2 раза в день по 1/3 стакана при отсутствии аппетита за 30 минут до еды, при диспепсии – после еды.

Продолжительность приема определяется врачом индивидуально с учетом характера заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением настоев рекомендуется взбалтывать.



Побочное действие. Аллергические реакции при повышенной индивидуальной чувствительности. При длительном применении может вызвать изжогу, гастрит, тошноту, рвоту, диарею. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием настоя и обратиться к врачу.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к лекарственному средству, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет; эпилепсия, повышенная желудочная секреция, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, язвенный колит, рефлюкс-эзофагит, острый холецистит, обструкция желчевыводящих путей, холангит, заболевания печени.

Передозировка. При передозировке оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему (головная боль, головокружение, тремор, судороги, галлюцинации). В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

Применение во время беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Прием препаратов травы полыни может повлиять на эффекты лекарственных средств, действующих через GABA рецепторы. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности. Пациентам с желчнокаменной болезнью и заболеваниями желчевыводящих путей перед приемом лекарственного средства необходимо проконсультироваться с врачом. Не следует принимать лекарственное средство более 2 недель. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния необходимо обратиться к врачу.

Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой. Прием лекарственного средства может повлиять на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. В случае возникновения нарушений со стороны нервной системы пациентам не следует управлять автотранспортом и работать с движущимися механизмами.

Условия и срок хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °C до 15 °C не более 2 суток. Срок годности – 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 50 г и 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. Предусмотрено вложение листка-вкладыша в пачку.

Производитель. ООО «Калина».

Адрес. Республика Беларусь,
211019, Витебская область,
Оршанский район, д. Пищалово
Тел. (0216) 54-81-68