

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: информация для пациента

Симет форте
120 мг, капсулы

Предназначен для применения у взрослых и детей старше 12 лет

Перед началом приема данного лекарственного средства внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важная для Вас информация.

Данное лекарственное средство следует принимать строго в соответствии с указаниями, изложенными в данном листке-вкладыше, или в соответствии с назначениями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочесть его снова.

Если у Вас появились вопросы или Вам нужна дальнейшая информация, обращайтесь к работнику аптеки.

При появлении каких-либо побочных действий обратитесь к врачу или работнику аптеки. Это касается любых возможных побочных действий – в том числе и тех, которые не описаны в данном листке-вкладыше.

При усугублении или отсутствии улучшения Вам следует обратиться к врачу.

Содержание данного листка-вкладыша:

1. Что представляет собой Симет форте и для чего он применяется;
2. Что необходимо знать перед приемом Симет форте;
3. Как принимать Симет форте;
4. Возможные побочные действия;
5. Как хранить Симет форте;
6. Содержимое упаковки и прочая информация.

1. Что представляет собой Симет форте и для чего он применяется

Действующим веществом лекарственного средства Симет форте является – симетикон – который приводит к распаду пузырьков газа, изменяя поверхностное натяжение и препятствует их соединению. Высвобождающиеся при этом газы могут затем всасываться стенкой кишки и выводиться под действием перистальтики кишечника.

Область применения

Симптоматическое лечение вздутия живота (метеоризма) у взрослых и детей старше 12 лет.

Сообщите лечащему врачу, если Вы чувствуете себя лучше или чувствуете ухудшение.

2. Что необходимо знать перед приемом Симет форте

Не принимайте Симет форте капсулы в случаях:

Гиперчувствительности к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ.

Полной кишечной непроходимости.


Обструктивных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Предупреждения и меры предосторожности

Перед приемом Симет форте проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, а также в случае длительных запоров пациент должен обратиться к врачу.

Симет форте не рекомендуется для применения у детей до 12 лет из-за отсутствия соответствующей информации.



Прием Симет форте и других лекарственных препаратов

Левотироксин может связываться с симетиконом. Абсорбция левотироксина в кишечнике может быть нарушена при одновременном приеме с симетиконом. Исследования взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились.

Беременность и период кормления грудью

В случае беременности или кормления грудью, а также при наличии возможной или планируемой беременности, перед приемом лекарственного средства обращайтесь за консультацией к врачу.

Данных по применению симетикона беременными нет. Данных о репродуктивной токсичности лекарственного средства, полученных в ходе проведения исследований на животных, недостаточно.

Хотя симетикон не всасывается в желудочно-кишечном тракте и является физиологически неактивным, Симет форте в период беременности следует назначать только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода.

Симетикон не выделяется в грудное молоко.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

3. Как принимать Симет форте

Данное лекарственное средство принимать строго по инструкции, изложенной в данном листке-вкладыше, или в соответствии с предписаниями врача или работника аптеки. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Дозировка

Для перорального применения.

Взрослые, дети старше 12 лет и пожилые люди: рекомендуемая доза - не более 4 капсул в сутки.

Принимать по одной капсуле после каждого основного приема пищи, запивая стаканом воды.

Продолжительность лечения составляет не более 10 дней.

Если Вы приняли большее количество Симет форте, чем следовало

Ни одного случая передозировки не зарегистрировано. В случае применения доз, больших, чем рекомендовано, следует обратиться к врачу.


Если Вы забыли принять Симет форте

Пропущенную дозу препарата можно принимать в любое время.

Если Вы прервали прием Симет форте

Жалобы могут появиться снова.

Если у Вас появились дальнейшие вопросы по использованию продукта, задайте их врачу.



4. Возможные побочные действия

До настоящего момента не отмечено никаких побочных действий, связанных с приемом Симет форте.

Сообщения о побочных действиях

При появлении побочных действий сообщите об этом своему лечащему врачу или работнику аптеки. Это касается любых побочных действий, в том числе не описанных в данном листке-вкладыше.

5. Как хранить Симет форте

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Симет форте:

Действующим веществом является симетикон.

Одна капсула содержит: симетикона – 120 мг.

Состав оболочки капсулы: желатин, глицерин, вода очищенная, натрия бензоат E-211.

Описание

Капсулы мягкие желатиновые шарообразной или почти шарообразной формы со швом и гладкой поверхностью полупрозрачные от бесцветного до светло-желтого цвета.

Форма выпуска

Мягкие желатиновые капсулы, по 15 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 1 контурной ячейковой упаковке вместе с листком-вкладышем в пачке.

Условия отпуска

Отпуск производится без рецепта врача

Информация о производителе

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,
220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 26

тел./факс (+ 37517) 276-01-59

e-mail: info@mic.by, www.mic.by

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь