


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (информация для пациента) по применению лекарственного средства

ХЛОРОФИЛЛИПТ-ФЕРЕЙН

Название лекарственного средства. Хлорофиллипт-Ферейн, раствор спиртовой.

Международное непатентованное название. Отсутствует.

Общая характеристика. Прозрачная жидкость зеленого цвета. В процессе хранения допускается выпадение мелкодисперсного осадка.

Состав лекарственного средства

Действующее вещество: хлорофиллипта экстракт густой (евкалипта листьев экстракт (DER: 10-14:1), экстрагент - 95 % этиловый спирт) с антибактериальной активностью в концентрации 12,5 мкг в 1 мл среды - 0,5 мг

Вспомогательные вещества:

этиловый спирт 95 % до 50 мл

Форма выпуска. Раствор для местного применения.

Код ATX. D08AX.

Фармакотерапевтическая группа. Дерматологические лекарственные средства. Антисептики и дезинфицирующие средства. Прочие антисептики и дезинфицирующие средства.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Обладает антибактериальным (бактериостатическим и бактерицидным) действием, особенно в отношении стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов. Оказывает противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Не изучена.

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные стафилококками, в том числе антибиотикорезистентными штаммами; ожоги, долго незаживающие раны и трофические язвы конечностей; эрозия шейки матки; для профилактики послеоперационных осложнений.

Способ применения и дозировка


Назначается местно.

При местном применении (лечение ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей) хлорофиллипта спиртовой раствор 1 % разводят 0,25 % раствором новокаина в соотношении 1:5 и используют в виде пропитанных раствором марлевых повязок. Курс лечения – 2-3 недели.

При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампонами все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки и смазывают канал шейки матки раствором хлорофиллипта спиртовым, разведенным 1:10. Манипуляцию проводят в течение 10 дней ежедневно, после чего на протяжении 2-х недель больная должна спринцеваться раствором препарата (1 столовая ложка раствора хлорофиллипта спиртового 1 % на 1 л воды). В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения необходимо повторить.

Побочное действие

Аллергические реакции при индивидуальной чувствительности к компонентам лекарственного средства.



Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

При применении внутрь – детский возраст до 18 лет.

Передозировка

Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности

Перед началом применения необходимо проконсультироваться с врачом.

Перед началом применения определяют чувствительность к хлорофиллипту, для чего больной выпивает 25 капель препарата, растворенного в 1 столовой ложке воды. При отсутствии через 6-8 ч признаков аллергии (отечность губ, слизистой зева и др.) препарат можно применять.

Хранить в недоступном для детей месте!

Применение при беременности и лактации

Результаты специально проведенных экспериментальных исследований показали, что хлорофиллит является нетоксичным и не обладает тератогенными и эмбриотоксическими свойствами. В периоды беременности и лактации применение препарата возможно, оценивая соотношение пользы и вреда.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! Лекарственное средство, применяемое как раствор для наружного применения, не влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами.

Следует соблюдать осторожность во время местного применения лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нужно учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода хлорофиллит выпадает в осадок. Поэтому после промывания раны перекисью водорода остатки ее должны быть удалены стерильным изотоническим раствором хлорида натрия.

Условия хранения

Не храните при температуре выше 25 °C.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта врача.

Упаковка

50 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками и крышками навинчивающими. На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или этикетки самоклеющиеся.

Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Информация о производителе

Произведено и расфасовано:

ЗАО «ВИФИТЕХ», Российская Федерация.

Тел./факс: +7 495 716-15-81, +7 495 716-15-90.

Упаковано:

СОАО «Ферайн», Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52А.

Тел./факс: +375 17 394-92-18, тел.: +375 17 222-97-73, +375 17 213-12-58, e-mail: office@ferane.by.