

## Инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш)

## МИРРОСЕПТ,

0,1 мг/мл, капли для местного применения


Действующее вещество: МИРИТИН (МИРАМИСТИН)

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРЕПАРАТА ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ ЛИСТОК, ПОСКОЛЬКУ В НЕМ СОДЕРЖАТСЯ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС СВЕДЕНИЯ**

- Сохраните этот листок. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Этот препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим. Он может навредить этим людям, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в данном листке.

**СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО ЛИСТКА**

1. Что из себя представляет МИРРОСЕПТ, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата МИРРОСЕПТ
3. Применение препарата МИРРОСЕПТ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата МИРРОСЕПТ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИРРОСЕПТ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Лекарственный препарат МИРРОСЕПТ содержит действующее вещество миритин (мирамистин). Миритин (мирамистин) обладает антисептическим действием, оказывает противовирусное, противогрибковое и антибактериальное действие.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**МИРРОСЕПТ применяют по следующим показаниям**

*Офтальмология:* в комплексном лечении инфекционных процессов переднего отдела глаза (блефаритов, конъюнктивитов, кератита, кератоувеита), травм глаза, ожогов глаз (термических и химических); в предоперационном и послеоперационном периодах для лечения и профилактики гнойно-воспалительных осложнений.

Лекарственный препарат МИРРОСЕПТ показан для профилактики офтальмии новорожденных, в том числе гонококковой и хламидийной.

*Оториноларингология:* в комплексном лечении острой и хронической формы ринита, синусита; острой и хронической формы наружного и среднего отита (в том числе с перфорацией барабанной перепонки), отомикозов.

**2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА МИРРОСЕПТ****Не применяйте МИРРОСЕПТ:**

- при аллергии (гиперчувствительности) к миритину (мирамистину) или любому другому компоненту этого лекарства (см. «Содержимое упаковки» в разделе 6).

**Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата МИРРОСЕПТ проконсультируйтесь с лечащим врачом или

2875 Б-2020

работником аптеки.

Контактные линзы следует снимать непосредственно перед закапыванием препарата МИРРОСЕПТ и надевать не ранее чем через 15 минут после закапывания.

Для того чтобы избежать загрязнения и перекрестного заражения, не следует использовать одну тубик-капельницу для одновременного лечения инфекции глаза, носа и/или уха. Для предотвращения загрязнения раствора препарата при закапывании следует избегать контакта кончика капельницы с глазом и кожей. Пользование тубик-капельницей более чем одним лицом может привести к распространению инфекции.

### **Другие препараты и МИРРОСЕПТ**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

При совместном применении миритина (мирамистина) и антибиотиков местного действия эффективность последних повышается. Исследования взаимодействия с другими лекарственными препаратами не проводились.

### **Беременность и кормление грудью**

Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки до начала приема данного препарата, если Вы беременны и кормите грудью, думаете, что беременны, планируете забеременеть.

Применять препарат МИРРОСЕПТ при беременности и грудном вскармливании возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и от занятий другими, потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения в течение 30 минут после закапывания в глаз.

## **3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МИРРОСЕПТ**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Как применять МИРРОСЕПТ**

Способ применения. Местно.

Рекомендации по использованию тубик-капельниц.

Тубик-капельницы предназначены для многократного применения.

Перед закапыванием необходимо тщательно вымыть руки, а затем снять с тубик-капельницы защитный колпачок, повернув его до полного открытия. Закиньте голову назад или лягте на спину. Поднесите тубик-капельницу к глазу, не касаясь ресниц или век. Аккуратно оттяните указательным пальцем нижнее веко вниз, чтобы образовался карман, в который нужно закапать препарат. Смотрите вверх. Мягко нажмите на корпус тубик-капельницы и закапайте необходимое количество капель. Закройте глаза на 1-2 минуты, не сжимая сильно веки. Чтобы мирамистин не утекал в нос, мягко нажмите пальцем на внутренний угол глаза. После применения корпус тубик-капельницы необходимо перевернуть горловиной вверх и накрутить защитный колпачок.

Режим дозирования.

*Взрослые*Офтальмология

С лечебной целью препарат МИРРОСЕПТ закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 4-6 раз в сутки до клинического выздоровления.

С профилактической целью препарат закапывают за 2-3 суток до операции, а также в течение 10-15 дней после операции по 1-2 капли 3 раза в сутки.

При лечении ожогов глаз, после промывания глаза большим количеством воды, проводят частые инстилляциии (каждые 5-10 минут) на протяжении 1-2 часов. Для дальнейшего лечения препарат применяют по 1-2 капли 4-6 раз в сутки.

Оториноларингология

При острой и хронической форме ринита, синусита по 2-3 капли в каждую половину полости носа до 4 раз в день. Курс лечения составляет 14 дней.

При острой и хронической форме наружного и среднего отита (в том числе с перфорацией барабанной перепонки), отомикозах по 5 капель в наружный слуховой проход до 4 раз в день. Курс лечения составляет 10 дней.

*Дети*Офтальмология

Для лечения бактериальных конъюнктивитов у детей препарат МИРРОСЕПТ закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле до 6 раз в сутки в течение 7-10 дней.

Оториноларингология

При острой и хронической форме ринита, синусита детям старше 1 года по 1-2 капли до 4 раз в день в течение 10-14 дней.

*Новорожденные*

Для профилактики офтальмии у новорожденных сразу после рождения ребенку закапывают по 1 капле препарата в каждый глаз 2 раза с интервалом 2-3 минуты.

В случае отсутствия положительной динамики (увеличение выраженности или появление новых признаков/симптомов заболевания, возникновение осложнений) на 3-4 день терапии с использованием препарата МИРРОСЕПТ необходимо обратиться к врачу!

**4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях может возникнуть ощущение легкого жжения, дискомфорт, которые проходят самостоятельно через 15-20 секунд и не требует отмены препарата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

**5. ХРАНЕНИЕ**

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не применяйте данный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца. Вскрытую тубик-капельницу хранить в течение 1 месяца. Хранить при температуре не выше 25 °С.



## 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

НД РБ

**МИРРОСЕПТ** содержит. Действующим веществом является миритин (мирамистин). Каждая тубик-капельница (5 мл) содержит 0,5 мг миритина (мирамистина).

Вспомогательными веществами являются вода для инъекций, натрия хлорид.

**Внешний вид лекарственного препарата МИРРОСЕПТ и содержимое упаковки.**

**Форма выпуска и описание.** Капли для местного применения. Бесцветный прозрачный раствор, пенящийся при встряхивании.

**Упаковка.** По 5 мл в тубик-капельницы. 1 или 5 тубик-капельниц и инструкцию по применению помещают в пачку.

**Порядок отпуска из аптек:** По рецепту.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель:**

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

Республика Беларусь, 222603, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, к. 3

Тел./факс: +375 (17) 373-31-90, тел.: +375 (1770) 5-93-59

E-mail: [mail@pharmland.by](mailto:mail@pharmland.by)