


НД РБ
2643 Б-2023



Листок-вкладыш – информация для пациента

Антигриппин® для детей, 250 мг + 3 мг + 50 мг, таблетки шипучие

Действующие вещества: парацетамол + хлорфенамина малеат + аскорбиновая кислота

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 3 дня Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Антигриппин® для детей, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Антигриппин® для детей.
3. Прием препарата Антигриппин® для детей.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Антигриппин® для детей.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Антигриппин® для детей, и для чего его применяют

Препарат Антигриппин® для детей содержит действующие вещества парацетамол (жаропонижающее средство), хлорфенамина малеат (антигистаминное средство) и аскорбиновую кислоту (витамин С).

Показания к применению

Препарат Антигриппин® для детей применяется у детей в возрасте от 6 лет для облегчения симптомов простудных заболеваний и гриппа, таких как высокая температура, головная и мышечная боль, насморк.

Способ действия препарата Антигриппин® для детей

Парацетамол оказывает болеутоляющий, жаропонижающий и слабый противовоспалительный эффект.

Хлорфенамина малеат обладает противоаллергическим действием, облегчает симптомы насморка, слезотечение, зуд в глазах и в носу.

Аскорбиновая кислота (витамин С) повышает сопротивляемость организма к инфекциям.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Антигриппин® для детей

Противопоказания

Не давайте Вашему ребенку препарат Антигриппин® для детей:

- если у Вашего ребенка аллергия на парацетамол, аскорбиновую кислоту, хлорфенамина малеат или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вашего ребенка тяжелые нарушения функции печени и/или почек;
- если Ваш ребенок принимал препараты ингибиторы моноаминоксидазы (применяются при депрессии, болезни Паркинсона) в течение последних 14 дней, так как антихолинергические свойства хлорфенамина усиливаются при применении ингибиторов моноаминоксидазы;
- если Ваш ребенок младше 6 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Антигриппин® для детей проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

До начала приема препарата Антигриппин® для детей обязательно сообщите врачу, если у Вашего ребенка:

- серьезное заболевание, включая тяжелую почечную недостаточность или сепсис (когда бактерии и их токсины циркулируют в крови, что приводит к повреждению органов), или Ваш ребенок страдает от длительного голодания, или принимает флуклоксациллин (антибиотик). Были получены сообщения о развитии серьезного состояния, с метаболическим ацидозом (изменение кислотно-щелочного баланса в крови) у пациентов, принимающих парацетамол в обычных дозах, в течение длительного периода времени или когда парацетамол принимался вместе с флуклоксациллином. Симптомы метаболического ацидоза могут включать: серьезное затруднение дыхания с глубоким учащенным дыханием, сонливость, тошноту и рвоту.
- нарушение функции почек;
- нарушение функции печени;
- врожденное повышенное содержание билирубина в крови (синдром Жильбера или болезнь Мейленграхта);
- оксалатные камни в почках (оксалатный уролитиаз);
- некоторые заболевания, при которых в организме накапливается слишком много железа (талассемия, гемохроматоз, сидеробластная анемия);
- алкогольная зависимость;
- имеется сужение выходного отверстия желудка (пилородуоденальная обструкция) и/или сужение выходного отверстия мочевого пузыря (обструкция шейки мочевого пузыря);
- повышенное внутриглазное давление (закрытоугольная глаукома);
- язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
- сверхактивная щитовидная железа (гипертиреоз);
- сердечная аритмия;
- тревожное расстройство;

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- судорожные приступы (эпилепсия);
- доброкачественное увеличение (гипертрофия) предстательной железы;
- стойкое повышение артериального давления (тяжелая артериальная гипертензия) или сердечно-сосудистые заболевания;
- заболевания дыхательных путей (бронхит, бронхоэктазы или бронхиальная астма);
- воздержание от приема пищи, хроническое недоедание (низкий запас печеночного глутатиона), обезвоживание.

Обратитесь к врачу, если симптомы ухудшаются, не наблюдается их облегчение в течение 3 дней или появляются другие симптомы, или если наблюдается высокая температура. Эти симптомы могут быть признаками более серьезного заболевания.

Без консультации с врачом Вашему ребенку следует принимать препараты, содержащие парацетамол (например, Антигриппин® для детей) только в течение нескольких дней и в рекомендованных количествах.

Парацетамол может вызывать тяжелые кожные реакции. Имеются сообщения об очень редких случаях серьезных нежелательных реакций со стороны кожи. Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к Вашему врачу, если у Вас или Вашего ребенка появится кожная сыпь или любые другие признаки аллергии или гиперчувствительности.

Не применяйте препарат Антигриппин® для детей одновременно с другими лекарствами, содержащими парацетамол, хлорфенамин или другие антигистаминные препараты.

Парацетамол и аскорбиновая кислота могут искажать показатели лабораторных исследований (количественное определение содержания глюкозы и мочевой кислоты в плазме, билирубина, активности «печеночных» трансаминаз, лактатдегидрогеназы).

Препарат Антигриппин® для детей содержит парацетамол. Прием слишком большого количества парацетамола может нанести серьезный вред печени. В этом случае требуется немедленная медицинская помощь. Уточните у лечащего врача или работника аптеки, содержат ли препараты, которые Ваш ребенок принимает одновременно, парацетамол.

Длительное применение высоких доз препаратов (например, Антигриппин® для детей), содержащих болеутоляющие средства, сверх рекомендованной дозы и продолжительности применения, может вызвать головную боль, которую нельзя лечить повышенными дозами препарата Антигриппин® для детей.

При приеме высоких доз Антигриппин® для детей, содержащаяся в препарате аскорбиновая кислота у больных с недостаточностью эритроцитарной глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (наследственное нарушение метаболизма эритроцитов) может в отдельных случаях вызывать выраженный гемолиз (разрушение эритроцитов). Поэтому рекомендуемая дозировка не должна превышать.

Если у Вашего ребенка обнаружена предрасположенность к образованию камней в почках, существует риск образования камней в почках (камни из оксалата кальция) при приеме больших количеств Антигриппин® для детей из-за содержащейся в составе аскорбиновой кислоты.

Дети и подростки

Препарат противопоказан к применению у детей в возрасте до 6 лет. Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 6 лет в связи с отсутствием данных по безопасности применения в данной возрастной группе.

Другие препараты и препарат Антигриппин® для детей

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Ваш ребенок принимает, недавно принимал или может начать принимать какие-либо другие препараты.

Взаимодействие активных ингредиентов, содержащихся в препарате Антигриппин® для детей, возможно с:

- препаратами, замедляющими желудочное опорожнение (например, пропантелин). Такие препараты могут задерживать всасывание парацетамола в организме и приводить к более медленному началу действия парацетамола;
- препаратами, которые усиливают опорожнение желудка (например, домперидон и метоклопрамид). Такие препараты могут ускорить всасывание парацетамола в организме и вызвать более быстрое действие парацетамола;
- препаратом зидовудин (используется для лечения ВИЧ-инфекции). Это может повысить риск развития нейтропении (уменьшения содержания лейкоцитов в крови). Поэтому препарат Антигриппин® для детей следует применять одновременно с зидовудином только по рекомендации врача;
- препаратом пробенецид (лекарство от подагры). Если Ваш ребенок одновременно принимает пробенецид, лечащий врач может уменьшить дозу препарата Антигриппин® для детей, так как биотрансформация парацетамола в организме может происходить медленнее;
- салициламидами (обезболивающие). Эффект препарата Антигриппин® для детей может быть продлен при одновременном применении с салициламидами;
- препаратами, вызывающими индукцию ферментов печени (например, некоторые снотворные (барбитураты), лекарства для лечения эпилепсии (фенитоин, карбамазепин), или лекарства для лечения туберкулеза (рифампицин)). Одновременное применение этих препаратов может усилить повреждающее действие парацетамола на печень;
- препаратами, разжижающими кровь (антикоагулянты, например, варфарин и другие кумарины). Антикоагулянтный (кроворазжижающий) эффект этих препаратов может усиливаться при длительном регулярном применении парацетамола с повышенным риском кровотечения; разовые дозы не оказывают существенного эффекта;
- колестирамином (лекарство, используемое для снижения высокого уровня холестерина в крови). Одновременное применение с колестирамином может снизить всасывание и действие парацетамола;
- флуклоксациллин (антибиотик), в связи с серьезным риском развития нарушения кислотно-щелочного баланса (так называемый метаболический ацидоз), который требует срочного лечения (см. раздел 2);
- препаратами с успокаивающим (седативным) эффектом, такими как противотревожные препараты (анксиолитики) или препараты для лечения бессонницы (снотворные). При одновременном применении седативное действие этих препаратов может быть усилено хлорфенамина малеатом;
- ингибиторами моноаминоксидазы (препараты для лечения депрессии), так как при одновременном применении действие хлорфенамина малеата на центральную нервную систему может быть усилено. Ингибиторы моноаминоксидазы могут продлить и усилить антихолинергическое действие хлорфенамина малеата;

- другими антигистаминными препаратами (препараты для лечения аллергии), включая препараты от кашля и простуды, содержащие антигистаминные препараты;
- препаратами железа, так как аскорбиновая кислота может увеличить всасывание железа при приеме внутрь;
- десферриоксамином (препарат для лечения избытка железа в организме), так как аскорбиновая кислота может увеличить выведение железа из организма.

Во избежание передозировки во время приема препарата Антигриппин® для детей не давайте ребенку никаких других лекарственных препаратов, содержащих парацетамол.

Во время лечения препаратом Антигриппин® для детей избегайте приема других успокаивающих (седативных) препаратов (особенно барбитуратов), так как они усиливают седативный эффект антигистаминных препаратов.

Взаимодействие препарата Антигриппин® для детей с алкоголем

Во время лечения препаратом Антигриппин® для детей избегайте употребления спиртных напитков, поскольку алкоголь в сочетании с парацетамолом может привести к нарушению функции печени.

Беременность и грудное вскармливание

Данный препарат предназначен для применения у детей. Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не принимайте препарат Антигриппин® для детей во время беременности.

Грудное вскармливание

Если Вы кормите грудью, не принимайте препарат Антигриппин® для детей, так как компоненты Антигриппин® для детей могут проникать в грудное молоко.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Лекарственный препарат оказывает значительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Воздержитесь от управления транспортными средствами (например, катание на велосипеде, самокате) и работы с механизмами во время лечения препаратом Антигриппин® для детей, поскольку препарат может вызывать такие нежелательные реакции, как сонливость, головокружение, нарушение фокусирования зрения. Эти эффекты усиливаются при приеме алкогольных напитков, спиртосодержащих лекарственных препаратов или седативных препаратов.

Препарат Антигриппин® для детей содержит сорбитол (E420) и натрий

Данный лекарственный препарат содержит 726 мг сорбитола в каждой шипучей таблетке. Сорбитол является источником фруктозы. Если лечащий врач сообщил, что у Вас или Вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров или у Вас диагностирована наследственная непереносимость фруктозы – редкое генетическое нарушение, при котором человек не может усваивать фруктозу, прежде чем Вы или Ваш ребенок начнете принимать данный лекарственный препарат, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Данный лекарственный препарат содержит 249,4 мг натрия (основной компонент пищевой/столовой соли) в каждой шипучей таблетке, что эквивалентно 12,5 % от рекомендуемого ВОЗ для взрослого человека максимального ежедневного поступления, равного 2 г натрия.

3. Прием препарата Антигриппин® для детей

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Дети младше 6 лет: прием лекарственного препарата противопоказан.

Дети от 6 до 10 лет: рекомендуется принимать лекарственный препарат Антигриппин® для детей по 1 шипучей таблетке 1–2 раза в день.

Дети старше 10 лет: рекомендуется принимать лекарственный препарат Антигриппин® для детей по 1 шипучей таблетке 2–3 раза в день.

Пациенты с почечной и печеночной недостаточностью

У пациентов с нарушениями функции печени и/или почек и врожденным повышенным уровнем билирубина в крови (синдром Жильбера или болезнь Мейленграхта) необходимо уменьшить дозу (прием у детей от 6 до 10 лет по 1 шипучей таблетке в день, у детей старше 10 лет по 1 шипучей таблетке 2 раза в день) или увеличить интервал между приемами.

Интервал между приемами лекарственного препарата должен составлять не менее 8 часов.

Препарат Антигриппин® для детей противопоказан к применению при тяжелых нарушениях функции печени, почек (см. раздел «Противопоказания»).

Применение у детей

Препарат Антигриппин® для детей противопоказан к применению у детей в возрасте от 0 до 6 лет (см. раздел «Противопоказания»), так как безопасность и эффективность препарата Антигриппин® для детей у детей в возрасте от 0 до 6 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Путь и (или) способ введения

Внутрь.

Шипучую таблетку следует полностью растворить в стакане (200 мл) теплой воды (50–60 °C) и полученный раствор сразу выпить. Лучше принимать препарат Антигриппин® для детей между приемами пищи. Интервал между приемами препарата должен быть не менее 4 часов.

Если температура не снижается после 3-х дней приема Антигриппин® для детей, и/или не происходит облегчения симптомов болезни, необходимо обратиться к врачу.

Лекарственный препарат не применяется для облегчения боли, не связанной с простудными заболеваниями, так как содержит компоненты, которые в сумме облегчают симптомы простуды.

Продолжительность лечения

Продолжительность лечения препаратом Антигриппин® для детей составляет не более 3 дней.

Если Вы приняли препарата Антигриппин® для детей больше, чем следовало

Немедленно обратитесь к врачу, если Ваш ребенок принял слишком много этого лекарства, даже если Ваш ребенок чувствует себя хорошо. Это связано с тем, что большое количество парацетамола может вызвать отложенное серьезное повреждение печени. Предъявляйте упаковку препарата при обращении к врачу.

При передозировке возможна тяжелая интоксикация, особенно у пожилых людей, детей младшего возраста, пациентов с заболеваниями печени, пациентов с хроническим алкоголизмом, пациентов с хроническим недоеданием, а также у пациентов, одновременно принимающих лекарственные препараты, которые являются индукторами ферментов печени.

(карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, примидон, рифампицин, зверобоя). Передозировка может привести к летальному исходу, особенно в описанных выше случаях.

Следующие признаки могут указывать на передозировку Антигриппин® для детей:

- парацетамол: при передозировке вначале (в 1-й день) могут возникнуть тошнота, рвота, потеря аппетита, бледность и боль в животе. Несмотря на улучшение общего состояния на 2-й день, может наблюдаться прогрессирующее поражение печени;
- хлорфенамина малеат: передозировка может вызвать покраснение лица, фиксированные и расширенные зрачки, сухость во рту и запор. Также наблюдались галлюцинации, нарушения координации и судороги;
- аскорбиновая кислота: при приеме в больших дозах может возникнуть преходящая диарея.

Если Вы забыли принять препарат Антигриппин® для детей

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу препарата Антигриппин® для детей. Примите следующую дозу в назначенное время.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Антигриппин® для детей может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Антигриппин® для детей и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов **серьезных нежелательных реакций**:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- кожные аллергические реакции (простая кожная сыпь или крапивница), возможно сопровождающаяся повышением температуры (лекарственная лихорадка) и поражением слизистых оболочек.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель (ангионевротический отек);
- тяжелые реакции гиперчувствительности (одышка, потливость, тошнота, бледно-синюшная, холодная, влажная кожа, падение артериального давления вплоть до недостаточности кровообращения (анафилактический шок);
- реакции гиперчувствительности дыхательных путей, вызванные парацетамолом, которые проявляются затруднением дыхания, свистящими хрипами, удушьем (бронхоспазм) у людей, которые ранее уже подвергались воздействию (анальгетическая астма).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла (тяжелые кожные реакции с образованием волдырей);
- метаболический ацидоз: серьезное состояние, которое может привести к повышению кислотности крови у пациентов с тяжелыми заболеваниями, принимающих парацетамол (см. раздел 2).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Антигриппин® для детей:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- нарушение внимания;
- нарушение координации движений;
- головокружение;
- головная боль;
- сухость во рту;
- чувство усталости.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- повышение показателей печени (печеночные трансаминазы).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- снижение количества лейкоцитов в крови (лейкопения);
- снижение количества нейтрофилов в крови (нейтропения);
- снижение количества зернистых лейкоцитов (гранулоцитов) в крови (агранулоцитоз);
- уменьшение количества тромбоцитов в крови (тромбоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура);
- снижение количества всех видов клеток крови – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов (панцитопения);
- анемия, при которой производится недостаточное количество клеток крови для функционирования организма (апластическая анемия);
- при высоких дозах изменение свойств пигмента крови гемоглобина, которое может привести к недостатку кислорода в тканях (незначительное образование метгемоглобина);
- повышение аппетита;
- психотические реакции;
- непроизвольные мышечные движения (дискинезия);
- повышение внутриглазного давления (провоцирование глаукомы (закрытоугольной глаукомы));
- нарушения зрения;
- желудочно-кишечные расстройства;
- поражение печени (в случае длительного приема более высоких доз или в случае передозировки);
- затрудненное мочеиспускание;
- длительное применение более высоких доз может привести к повреждению почек.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- разрушение красных кровяных клеток (гемолитическая анемия) у людей с дефицитом глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы;
- снижение аппетита;
- беспокойство;
- бессонница;
- спутанность сознания;
- возбуждение;
- раздражительность;
- ночные кошмары;
- снижение настроения (депрессия);
- седативный эффект;
- сонливость;
- нарушения ритма сердца (аритмии), такие как увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия);
- повышение артериального давления;
- давящая боль в области сердца (стенокардия);
- мышечные подергивания;
- мышечная слабость.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242 00 29; факс: +375 (17) 242 00 29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Антигриппин® для детей

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на пластиковом пенале и картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не храните при температуре выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Антигриппин® для детей содержит

Действующими веществами являются парацетамол, хлорфенамина малеат, аскорбиновая кислота.

Каждая таблетка шипучая содержит 250 мг парацетамола, 3 мг хлорфенамина малеата и 50 мг аскорбиновой кислоты.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: натрия гидрокарбонат, лимонная кислота безводная, сорбитол (Е 420), повидон К30, натрия сахаринат (Е 954), натрия карбонат, макрогол 6000, кремния диоксид коллоидный безводный, ароматизатор «Красные фрукты» (натуральные ароматизаторы, мальтодекстрин, гуммиарабик, монопропиленгликоль), порошок красного свекольного сока (концентрат сока красной свеклы, мальтодекстрин, регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), магния стеарат.

Препарат Антигриппин® для детей содержит натрий, сорбитол (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Антигриппин® для детей и содержимое упаковки

Таблетки шипучие.

Таблетки круглые, плоские, со скошенным краем и разделительной риской с одной стороны, светло-розового цвета с более светлыми и более темными вкраплениями с фруктовым запахом.

По 10 таблеток в пластиковом пенале, укупоренном пробкой с влагопоглотителем, с кольцом контроля первого вскрытия вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

По 6 таблеток в алюминиевом стрипе, по 5 стрипов вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Республика Беларусь

ООО «БАУШ ХЕЛС»

г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 22

Производитель

Польша

Natur Produkt Pharma Sp.z.o.o

г. Острав-Мазовецка, ул. Подсточисто 30

или

Республика Беларусь

ИПТУП «РЕБ-Фарма»

Минская область, Червенский р-н, г.п. Смиловичи, ул. Садовая, 1

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

НД РБ

2643 Б-2023



Республика Беларусь

ООО «БАУШ ХЕЛС»

220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 22, оф. 22

Телефон/факс: +375 17 397 44 22

Адрес электронной почты: office.by@bausch.com

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: <https://rceth.by>.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации), сайт уполномоченного органа <https://rceth.by>.