

НД РБ

3597 - 2020



## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

**ФЛЕБОДИА 600, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Действующее вещество: Диосмин

**Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, поскольку он содержит важную для вас информацию.**

Всегда принимайте препарат в точном соответствии с данным листком-вкладышем или с назначением врача или работника аптеки.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно вам потребуется прочитать его еще раз.
- Обратитесь за дополнительной информацией или консультацией к врачу или работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, сообщите своему врачу или работнику аптеки. Это касается любых возможных нежелательных реакций, в том числе, не указанных в данном листке-вкладыше (смотри раздел 4).
- Вы должны обратиться к врачу, если улучшение не наступает или вы почувствовали себя хуже.

В настоящем листке-вкладыше приводится следующая информация:

1. Что представляет собой препарат ФЛЕБОДИА 600 и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ФЛЕБОДИА 600.
3. Применение препарата ФЛЕБОДИА 600.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ФЛЕБОДИА 600.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

### **1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕПАРАТ ФЛЕБОДИА 600 И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Таблетки ФЛЕБОДИА 600 содержат действующее вещество диосмин, которое относится к группе препаратов, снижающих проницаемость капилляров. ФЛЕБОДИА 600 обладает венотонизирующим и сосудопротекторным свойствами. Уменьшает растяжимость вен и венозный застой, уменьшает проницаемость капилляров и увеличивает их резистентность.

Таблетки ФЛЕБОДИА 600 применяются в составе комплексной терапии:

- для уменьшения симптомов лимфовенозной недостаточности нижних конечностей (ощущение тяжести или усталости в ногах, боль);
- дополнительное лечение при нарушении микроциркуляции;
- симптоматическое лечение острого геморроя.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## **2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ФЛЕБОДИА 600**

### **Не принимайте препарат ФЛЕБОДИА 600:**

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на диосмин или какие-либо другие ингредиенты данного лекарственного препарата (смотри раздел б).

### **Предупреждения и меры предосторожности**

Проконсультируйтесь со своим врачом или работником аптеки, прежде чем начать прием препарата ФЛЕБОДИА 600.

### **Специальные предупреждения**

Если чувство дискомфорта и ломкость сосудов не уменьшаются в течение 15 дней, обратитесь к лечащему врачу.

Если симптомы, связанные с геморроем, сохраняются после нескольких дней лечения, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

### **Меры предосторожности при использовании**

На эффективность терапии лекарственным препаратом оказывает влияние соблюдение здорового образа жизни.

Избегайте воздействия солнечных лучей, жары, длительного стояния на ногах, избыточного веса.

Ходьба и, при необходимости, ношение компрессионного трикотажа способствуют улучшению кровообращения.

### **Дети**

Не давайте препарат детям в возрасте до 18 лет вследствие вероятной небезопасности.

### **Другие препараты и препарат ФЛЕБОДИА 600**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки если вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

### **Беременность и кормление грудью**

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что вы беременны или планируете беременность, проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом прежде, чем начать применение данного препарата.

### **Беременность**

Применение лекарственного препарата во время беременности только по рекомендации лечащего врача.

Если вы забеременели во время лечения, проконсультируйтесь с лечащим врачом, только он может решить, нужно ли вам продолжать лечение.

### **Кормление грудью**

Поскольку нет данных о проникновении этого лекарственного препарата в грудное молоко, лечение препаратом во время грудного вскармливания не рекомендовано.

НД РБ  
3597 - 2020



### **Вождение автотранспорта и управление механизмами**

Препарат ФЛЕБОДИА 600 не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами.

Препарат ФЛЕБОДИА 600 содержит краситель пунцовый (Понсо 4R) и может стать причиной аллергических реакций.

## **3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ФЛЕБОДИА 600**

Всегда принимайте этот лекарственный препарат в точном соответствии с данным листком-вкладышем или с назначением вашего лечащего врача. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

### **Режим дозирования**

- Нарушения венозного кровообращения: 1 таблетка в день во время еды.
- Приступы геморроя: 2-3 таблетки в день во время еды.

### **Способ применения**

Для приема внутрь.

Таблетку проглатывают, запивая половиной стакана воды.

**Если вы приняли препарат ФЛЕБОДИА 600 больше, чем предусмотрено**  
Не превышайте рекомендуемую дозу.

**Если вы забыли принять препарат ФЛЕБОДИА 600**  
Не удваивайте последующую дозу.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарственного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

## **4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**


Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

### **Часто (могут возникать не более, чем у 1 человека из 10):**

- боль в животе.

### **Нечасто (могут возникать не более, чем у 1 человека из 100):**

- аллергические реакции такие как сыпь, зуд, крапивница, отек лица и горла;
- вздутие живота;
- диарея;
- затруднение пищеварения;



- тошнота.

**Редко (могут возникать не более, чем у 1 человека из 1000):**

- рвота.

Нарушения пищеварения редко приводят к прекращению лечения.

#### **Сообщения о нежелательных реакциях**

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

### **5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ФЛЕБОДИА 600**

Хранить при температуре не выше 30°C.

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте этот лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Проконсультируйтесь у работника аптеки, как утилизировать лекарственные препараты, которые вы больше не используете. Указанные меры направлены на защиту окружающей среды.

### **6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

**Препарат ФЛЕБОДИА 600 содержит**

- Действующим веществом является Диосмин. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 600 мг Диосмина (в пересчете на сухое вещество).
- Вспомогательными веществами являются: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, кремния диоксид коллоидный, стеариновая кислота микронизированная;  
Состав пленочного покрытия: гипромеллоза, целлюлоза микрокристаллическая, макрогола стеарат 400, пропиленгликоль, титана диоксид, краситель пунцовый, железа оксид черный, железа оксид красный, воск карнаубский, воск пчелиный, шеллак, этанол 95%.

**Внешний вид препарата ФЛЕБОДИА 600 и содержание упаковки**

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой розового цвета.

По 15 или 18 таблеток в ПВХ/алюминиевом блистере.

1, 2 или 4 блистера по 15 таблеток с инструкцией по применению в картонной пачке.


1 блистер по 18 таблеток с инструкцией по применению в картонной пачке.

**Отпуск из аптек:**

Без рецепта врача.

НД РБ

3597 - 2020



**Держатель регистрационного удостоверения**

Лаборатории Иннотера  
22, авеню Аристид Бриан  
94110 Аркей, Франция

**Производитель**

Иннотера Шузи  
Рю Рене Шантеро, Шузи-сюр-Сис, Валуар-сюр-Сис,  
41150 Франция

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Представительство АОУТ «Laboratoire Innotech International» (Французская Республика) в  
Республике Беларусь  
ул. Левкова, д.43, офис 313  
220007, г. Минск  
тел./ факс +375 17 336 05 99

Данный листок-вкладыш пересмотрен

13.10.2022