



**Листок-вкладыш  
лекарственного средства**

# Мукоплант Сироп с подорожником

**Название лекарственного средства**  
**Мукоплант Сироп с подорожником**

**Международное непатентованное  
название**

Нет

**Лекарственная форма**

Сироп 100 мл или 250 мл

**Состав**

100 мл препарата содержат  
активное вещество - Жидкий экстракт  
подорожника ланцетного 1:1, спиртовой,  
(экстрагент этанол 20%) - 6,40 г.

250 мл препарата содержат  
активное вещество - Жидкий экстракт  
подорожника ланцетного 1:1, спиртовой,  
(экстрагент этанол 20%) - 16,00 г.

**вспомогательные вещества:** мяты перечной  
масло, сахарный сироп инвертный, свеклы  
сахарной сироп, мед, калия сорбат, вода  
очищенная.

Лекарственное средство содержит 1,6%  
этилового спирта.

**Описание**

Темно-коричневая вязкая жидкость с  
ароматным запахом  
и характерным сладким вкусом.

**Фармакотерапевтическая группа**

Отхаркивающие средства.

Код ATC R05CA

**Фармакологические свойства**

Полисахариды, входящие в состав  
экстракта листьев подорожника, оказывают  
обволакивающее действие на слизистую  
оболочку верхних дыхательных путей,  
способствуют уменьшению раздражения  
слизистой оболочки и связанного с ним  
кашля.

**Показания к применению**

- Внутрь: в комплексной терапии  
для симптоматического лечения  
воспалительных заболеваний верхних  
дыхательных путей, сопровождающихся  
кашлем. Применение по указанным  
назначениям основывается только на  
опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, запивая небольшим количеством  
воды:

- дети 3-4 лет: 2-3 раза в день по 10 мл с  
равными интервалами между приемами;
- дети 5-11 лет 2-3 раза в день по 15 мл с  
равными интервалами между приемами;
- подростки 12-18 лет, взрослые и пожилые  
люди: 3-4 раза в день по 15 мл с равными  
интервалами между приемами

Длительность курса лечения определяется  
врачом с учетом особенностей  
заболевания, достигнутого эффекта и  
переносимости лекарственного средства.  
Дозирование осуществляется с помощью  
мерного стаканчика.

Применение у детей до 3 лет не  
рекомендуется в связи с отсутствием  
достаточных данных

**Побочное действие**

- Возможны аллергические реакции.  
В случае возникновения побочных  
реакций, в том числе не указанных в  
данной инструкции, следует прекратить  
применение лекарственного средства и  
обратиться к врачу.

**Противопоказания**

- повышенная индивидуальная  
чувствительность к компонентам  
препарата (в том числе к продуктам  
пчеловодства)
- детский возраст до 3 лет
- дефицит сахаразы/изомальтазы,  
непереносимость фруктозы, глюкозо-  
галактозная мальабсорбция

**Взаимодействия с другими**

**лекарственными средствами**

Не следует применять одновременно  
с противокашлевыми препаратами  
и лекарственными средствами,  
уменьшающими образование мокроты,  
так как это затрудняет откашивание  
разжиженной мокроты. В случае  
одновременного приема других  
лекарственных средств необходимо  
проконсультироваться с врачом.

ANSICHTS-PDF – KEINE DRUCKDATEN

Kunde:	Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Projekt:	SpiHuSa_BPZ_Muco_HoMinz_BY_Reg-E3

Druckerzeugnis: Beipackzettel

Kontur:

Dokumentformat: 130 x 186 mm

Auftr.-Nr.: 1216001

EAN:

Art.-Nr.: 00728525

Fertigw.-Nr.: 41107/0 741108/0

KONTUR

Druckfarben:

HKS 6 black

**Achtung!**

Bitte prüfen Sie die Daten auf Vollständigkeit, Richtigkeit und auf alle gesetzlichen Anforderungen, die an die Kennzeichnung des jeweiligen Produktes gestellt werden. Dem Hersteller obliegt es, die Daten auf die Anforderungen der erforderlichen Drucktechnik anzupassen.

Diese Vorlage und alle darin enthaltenen Elemente unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck für das vorstehend bezeichnete Produkt verwendet werden. Eine Nutzung über diesen Zweck hinaus ist rechtlich unzulässig.

Datum:

Reinzeichnung:

Versand an:

Best.-Nr.:

**hd.** hartmann  
designagentur  
T +49 (0)6371 52848

Grundtext Schriftgröße 7,5 pt



**DR.THEISS**

3907 - 2018

**СОГЛАСОВАНО**  
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 Приказ Министерства здравоохранения  
 Республики Беларусь

**Особые указания**

Сироп содержит углеводы, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также при гипокалорийной диете.

1 мерный стаканчик (15 мл) содержит примерно 10,12 г углеводов, что соответствует примерно 0,84 ХЕ. Если Вы поддерживаете диабетическую диету, Вам следует это учитывать.

Лекарственное средство содержит сахарный сироп (сахароза, декстроза, фруктоза), может вызывать повреждение зубов при длительном применении (2 недели и более).

Препарат содержит 1,6% (по объему) этилового спирта, что эквивалентно 190 мг на дозу 15 мл.

- В связи с содержанием этилового спирта лекарственное средство не рекомендовано для пациентов, страдающих алкоголизмом. Следует соблюдать осторожность при назначении лекарственного средства детям, а также пациентам из группы высокого риска, в том числе с заболеваниями печени и эпилепсией. Лекарственное средство не рекомендовано для приема во время беременности и лактации.

С осторожностью принимать лекарственное средство пациентам с повышенной кислотностью желудочного сока, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагитом.

- Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или в случае ухудшения состояния (развитие нарушений дыхания, подъем температуры или появление гнойной мокроты), необходимо обратиться к врачу.

**Применение в период беременности и в период грудного вскармливания**

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

**Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортными средствами или потенциально опасными механизмами.**

Исследования не проводились.

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Передозировка**

**Симптомы:** усиление побочных эффектов.  
**Лечение:** отмена препарата. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Форма выпуска и упаковка**

По 100 мл или 250 мл препарата помещают в стеклянные флаконы коричневого стекла с завинчивающейся пластиковой крышкой.

Флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона, в которой находится мерный стаканчик.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °C в упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности**

3 года  
 Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

**Производитель:**

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ  
 Мишелингштрассе 10, 66424 Хомбург,  
 Германия  
 Тел.: 06841-709-151, Факс 06841-709-153

**Представительство в Республике Беларусь:**  
 ИООО «Натусана»  
 Республика Беларусь  
 220140, г. Минск, ул. Лещинского, д. 8/4-1  
 Тел.: (017) 256-55-45

00728525 74107/0 74108/0



**DR. THEISS**