

**ИНСТРУКЦИЯ  
(листок-вкладыш)**

**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА**

**ВИТАПРОСТ®**

- Внимательно прочтайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

**Торговое название препарата:** Витапрост®

**Международное непатентованное название:** отсутствует

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные

**Состав:**

Один суппозиторий содержит:

*действующее вещество:* простаты экстракт – 50 мг, в пересчете на водорастворимые пептиды – 10 мг;

*основа для суппозиториев:* жир твердый (Витепсол (марки Н 15, В 35) или Суппосир (марки НА 15, НАС 50)) – до получения суппозитория массой 1,25 г.

**Описание:**

Суппозитории от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

**Фармакотерапевтическая группа:** Другие урологические средства.

**Код АТХ:** G04BX.

**Фармакологические свойства**

Витапрост® обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной

<b>СОГЛАСОВАНО</b>
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от « <u>04</u> » <u>04</u> 20 <u>19</u> г. № <u>834</u>



уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Витапрост® нормализует параметры предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраниет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

### **Фармакокинетика**

Не изучена.

### **Показания к применению**

Хронический простатит.

Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

### **Способ применения и дозы**

Ректально, по 1 суппозиторику после самопроизвольного опорожнения кишечника или клизмы 1 раз в день. После введения суппозитория желательно пребывание пациента в постели в течение 30-40 минут. Длительность курса лечения препаратом Витапрост® – не менее 10 дней.

При необходимости возможно проведение повторных курсов.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции.

*Если любые из указанных выше побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.


### **Передозировка**

О случаях передозировки препарата Витапрост® не сообщалось.

### **Меры предосторожности**

Применяют только для лечения взрослых мужчин; не применяют у женщин и детей.

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим



наряду с назначением препарата Витапрост® применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.

До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

#### **Применение в период беременности и лактации**

Препарат не применяется у женщин.

#### **Применение у детей**

Применение препарата у детей противопоказано.

#### **Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат может применяться в комплексной терапии.

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

#### **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 10 мг. По 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

#### **Условия отпуска из аптек**

Отпускают без рецепта.



6222 - 2017

Производитель/организация, принимающая претензии:

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: [med@stada.ru](mailto:med@stada.ru)

