


4239 - 2018

Листок-вкладыш
лекарственного средства
САЛВАТ**ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:** САЛВАТ

МНН – нет

Лекарственная форма: сбор растительный**Описание.** Смесь измельченного растительного сырья с характерным видом и запахом**Состав.****1 фильтр-пакет (1,0 г) содержит:**

| | |
|---|---------|
| Agrimoniae herba/трава репешка обыкновенного | 0,250 г |
| Marrubii herba/трава шандры | 0,250 г |
| Boldo folium/лист больдо | 0,100 г |
| Frangulae cortex/кора крушины | 0,100 г |
| Matricariae flos/цветы ромашки | 0,100 г |
| Menthae piperitae herba/трава мяты перечной | 0,100 г |
| Taraxaci radix с. Herba/корень и трава одуванчика | 0,100 г |

Фармакотерапевтическая группа. Прочие лекарственные средства.**Код АТС:** V03AX**Показания к применению.**

Применяется по назначению врача в качестве желчегонного средства в комплексной терапии заболеваний желчного пузыря.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы.

Если врачом не назначено иначе: 2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 250 мл (1 стакан) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 5-10 минут. Фильтр-пакеты отжимают и вынимают. Приготовленное водное извлечение (чай) принимают внутрь в теплом виде 3 раза в день, за полчаса до еды, мелкими глотками.

Водное извлечение (чай) нельзя кипятить. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата или ментолу или к растениям семейства Asteraceae (Compositae) (астровые (сложноцветные) - арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема) или к растениям семейства Labiales (Lamiaceae) (губоцветные (яснотковые) - базилик, розмарин, шалфей, майоран, Melissa, тимьян), беременность и кормление грудью, дети и подростки до 18 лет, боли в животе неизвестного происхождения, заболевания печени, острое воспаление желчного пузыря, аппендицит, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, воспаление толстой кишки), кишечная непроходимость, непроходимость желчевыводящих путей, холангит, желчнокаменная болезнь, пептическая язва в стадии обострения, атония или стеноз кишечника, состояние тяжелой дегидратации с электролитными нарушениями.

Побочные действия. У лиц с повышенной чувствительностью могут появиться аллергические реакции на отдельные компоненты сбора. Очень редко сбор может вызвать боли в животе, боли в животе спастического характера и жидкий стул, особенно у пациентов с раздраженным кишечником. Корень и трава одуванчика могут вызвать повышение кислотности желудочного сока и боли в эпигастрии.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. Длительный прием коры крушины может вызвать нарушения водно-электролитного баланса, возможно появление альбинурии и гематурии.

Длительное употребление коры крушины может привести к развитию гиперпигментации слизистой оболочки кишечника (псевдомеланоз кишечника), которая обычно регрессирует после прекращения приема препарата.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. В связи с отсутствием достаточных данных не следует назначать лекарственное средство детям и подросткам до 18 лет.

В связи с риском развития электролитных нарушений следует избегать назначения лекарственного средства пациентам с почечной и/или сердечной недостаточностью, сахарным диабетом.

Пациенты с гастроэзофагеальным рефлюксом должны избегать приема препаратов с содержанием мяты перечной, так как они могут усилить изжогу.

Лекарственное средство противопоказано пациентам с желчнокаменной болезнью, острым воспалением желчного пузыря, холангитом, непроходимостью желчевыводящих путей.

Пациентам с другими заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей необходима консультация врача для оценки соотношения польза/риск до начала приема лекарственного средства. Во время приема лекарственного средства необходимо наблюдение врача.

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Гипокалиемия (в результате длительного употребления слабительных средств) способствует развитию побочных эффектов сердечных гликозидов, антиаритмических лекарственных средств (например, хинидин) и лекарственных средств, вызывающих удлинение интервала QT. Одновременное применение с другими лекарственными средствами, вызывающими гипокалиемию (например, диуретики, антиаритмические средства, адренокортикостероиды, корень солодки) может усилить электролитный дисбаланс. Пациенты, принимающие указанные лекарственные средства, должны перед употреблением препарата Салват проконсультироваться с врачом.

Сбор растительный может уменьшить абсорбцию одновременно принимаемых лекарственных средств.

Беременность и лактация

Не применять беременным и кормящим грудью женщинам (см. Раздел «Противопоказания»).

Влияние на способность управления транспортными средствами и обслуживания станков

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автотранспортом и работу с движущимися механизмами не проводились.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и влаги, недоступном для детей месте.

Срок годности. 2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек. Без рецепта.

Упаковка. По 1,0 г сбора в фильтр-пакете. 20 фильтр-пакетов в картонной пачке, обтянутой упаковочной пленкой из полипропилена.

Общая масса содержимого в упаковке 20 г

Производитель: Фирма LEROS s.r.o. , У Народной галереи, 470 156 15 Прага 5 – Збраслав, Чешская Республика

www.leros.cz

e-mail: leros@leros.cz