


НД РБ
7098 - 2019



ЛИСТОК – ВКЛАДЫШ
по медицинскому применению лекарственного средства

БЕНЗИЛБЕНЗОАТА ЭМУЛЬСИЯ
(BENZYLII BENZOATIS)

Прочитайте внимательно листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства. Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его заново. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Международное непатентованное название: Benzyl benzoate.

Форма выпуска. Эмульсия для наружного применения.

Описание лекарственной формы. Эмульсия белого цвета со слабым специфическим запахом, пенящаяся при взбалтывании. Допускается частичное расслоение эмульсии, устраняемое при взбалтывании.

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: 1 г препарата содержит бензилбензоата 200 мг;

вспомогательные вещества: мыло хозяйственное твердое, эмульгатор Т-2, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа. Средства для уничтожения эктопаразитов, включая средства против чесоточного клеща. Код АТС P03A X01.

Показания к применению.

Чесотка.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гнойничковые заболевания и повреждения кожи. Дети до 3 лет. Период беременности и кормления грудью.

Меры предосторожности.

Необходимо предотвращать попадание лекарственного средства в глаза и на слизистые оболочки.

При обработке препаратом необходимо придерживаться правил личной гигиены, запрещается курить, принимать алкогольные напитки и пищу.


При случайном попадании лекарственного средства:

- *в рот:* рот прополоскать водой или теплым 2 % раствором натрия гидрокарбоната;

- *в желудок:* при случайном применении препарата внутрь следует немедленно обратиться к врачу;

- *в глаза:* тщательно промыть водой или 1 % раствором натрия гидрокарбоната; при раздражении слизистой оболочки глаз закапать 30 % раствором альбуцида, при возникновении боли – 2 % раствором новокаина;

После окончания курса лечения необходим лекарственный контроль в течение 2 недель (а при наличии осложнений – и более).



7098 - 2019

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Обработка больных в одном очаге, а также контактных ~~лиц~~ ~~следует~~ ~~проводить~~ одновременно.

Осложнения в виде пиодермитов, экземы следует ~~лечить~~ ~~одновременно~~ ~~с~~ ~~чесоткой~~ и продолжать после ее ликвидации.

Перед началом лечения чесотки больному следует принять душ для механического удаления с поверхности кожи клещей, а также для распушивания поверхностного слоя эпидермиса (для облегчения проникновения препарата).

После каждого вынужденного мытья рук их необходимо снова обработать. Обязательно следует проводить обработку нательного и постельного белья, верхней одежды и головных уборов.

Все белье и то, что соприкасалось с пораженной кожей должно подвергаться тщательной обработке. Для этого постельное и нижнее белье, полотенца и верхнюю одежду следует стирать при температуре не ниже 60 ° С. Верхнюю одежду можно также прогладить с обеих сторон горячим утюгом. Вещи, не подлежащие термической обработке, могут быть вывешены на открытый воздух на 3 дня. Для дезинфекции некоторых вещей (детские игрушки, обувь) можно применять способ временного исключения из использования, для чего их помещают в герметически закрытые полиэтиленовые пакеты минимум на 3 дня.

Ковры, матрасы и мягкую мебель следует тщательно пропылесосить, обработать средствами для дезинфекции или подвергнуть камерной дезинфекции. В квартире необходимо провести уборку, мытье полов с моющими средствами или добавлением дезинфицирующих средств.

Рекомендуется во время лечения избегать интенсивного воздействия солнечного света.

Ногти должны быть чистыми и коротко острижены.

Сохранение зуда в течение нескольких дней после полноценного курса лечения не является показателем его неэффективности. Зуд является реакцией организма на убитого клеща и продукты его жизнедеятельности, исчезает при назначении антигистаминных препаратов.

Применение у лиц с нарушением функции печени и почек не изучено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Нежелательно одновременное назначение с другими лекарственными средствами для наружного применения.

Особые предостережения.

Дети. Не рекомендуется назначать лекарственное средство детям в возрасте до 3-х лет. Детям от 3 - 5 лет препарат разводят кипяченой водой в соотношении 1:1.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата в период беременности противопоказано. В период лечения кормление грудью необходимо прекратить.


Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. Не влияет на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие повышенной концентрации внимания.

Способ применения и дозировка.

Наружно, местно (перед применением взболтать). Детям в возрасте от 3 - 5 лет препарат разводят кипяченой водой в соотношении 1:1.

Лечение чесотки. Бензилбензоата эмульсию применяют наружно согласно следующему алгоритму:

1-й день – необходимо вымыться под душем теплой водой с мылом, вытереться полотенцем; 200 мл препарата тщательно втереть в кожу рук, затем туловища и ног,



7098 - 2019

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Украины

Республики Житомир

Житомир, 2019

включая подошвы и пальцы, исключая лицо и волосы. Руки после обработки не следует мыть в течение 3 часов, в последующем втирать препарат в кожу кистей после каждого их мытья. На смазанную кожу надеть чистое постельное белье, сменить постельное белье.

2-й и 3-й дни – не следует наносить препарат, мыться и менять нательное и постельное белье.

4-й день – вечером следует принять душ, вымыться с мылом, вытереться полотенцем. Обработку повторить, на смазанную кожу надеть чистое постельное белье, сменить постельное белье.

5-й день – необходимо смыть остатки препарата теплой водой с мылом без растирания кожи, сменить нательное и постельное белье.

Для предупреждения вторичной инвазии необходимо одновременное лечение всех совместно проживающих членов семьи, а также контактных лиц.

Передозировка.

При использовании эмульсии по назначению случаи передозировки не известны.

При случайном проглатывании или использовании очень большого количества эмульсии возможно: усиление побочных эффектов, появление признаков возбуждения центральной нервной системы (судороги), внезапная потеря сознания, задержка мочи.

Лечение: немедленно обратиться к врачу, симптоматическая терапия.

Побочное действие.

Возможно легкое раздражение кожи, покраснение кожи, ощущение кратковременного жжения, зуд, сухость участка кожи, обрабатываемого препаратом, аллергические реакции. При развитии выраженных побочных эффектов следует немедленно смыть лекарственное средство при помощи мыла.

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Срок годности. 3 года.

После первого вскрытия флакона препарат годен в течение 7 дней.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка.

По 50 г во флаконе в упаковке № 1.

В упаковку дополнительно вкладывают инструкцию по медицинскому применению или листок-вкладыш.

Название и адрес производителя.

ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика».

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишовка, ул. Королева, д. 4.

