

**ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению препарата

**Успокой****Торговое название**

Успокой

28 12 8 144

**Международное непатентованное название:** отсутствует**Форма выпуска**

Таблетки гомеопатические.

**Состав (на 1 таблетку)**

Активные компоненты (в виде гомеопатической тритурации в соотношении 1:1:1) – 0,0024 г: *Zincum isovalerianicum* (Цинкум изовалерианикум) C200, *Cimicifuga racemosa* (Цимицифуга рацемоза) C200, *Strychnos ignatii* (Стрихнос игнации) C200.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат – 0,2112 г, целлюлоза микрокристаллическая – 0,0240 г, магния стеарат – 0,0024 г.

**Описание**

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, белого или почти белого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Прочие лекарственные средства.

**Кот АТХ**

V03AX

**Фармакологическое действие****Фармакодинамика**

Гомеопатическое средство действует особым образом. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

**Фармакокинетика**

Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяет оценивать содержание гомеопатических лекарственных средств в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики препарата.

**Область применения**

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических

(медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии при неврастении.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст (до 18 лет).

### **Беременность и лактация**

Применение препарата при беременности и в период лактации противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Препарат принимают ежедневно по 1 таблетке утром, не менее чем за 15 минут до еды. Таблетку следует держать под языком, не разжевывая и не проглатывая, до полного растворения.

При неврастении допустимо принимать препарат 2-3 раза в день.

Курс лечения составляет 1-2 месяца. При необходимости курс лечения повторить через две-три недели.

Продолжительность курса лечения и необходимость в проведении повторного курса определяется врачом.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе, не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Передозировка**

При передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата вспомогательными веществами.

Лечение симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрированы. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами**

Во время лечения рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами.

### **Меры предосторожности**

В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются, или

7064 - 2018

происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

### **Упаковка**

Таблетки гомеопатические. По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению (и/или листком-вкладышем) помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

В течение периода применения препарата хранить контурную ячейковую упаковку в картонной пачке, предусмотренной производителем.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения/Производитель**

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9.

Тел./факс: +7 (495) 684-43-33.

### **Адрес места производства лекарственного средства**

Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54.

### **Адрес организации, принимающей на территории Республики Беларусь претензии от потребителей по качеству продукции**

Представительство ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» в Республике Беларусь:

220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65 Б, помещение 74 А.

Тел./факс: +375 (17) 323-58-68.

E-mail: bel@dep.materiamedica.ru

Директор Департамента регистрации  
ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»

