

1626 - 2020

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**Название лекарственного препарата****ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы**

Сухой экстракт иглицы, титрованный в стероловых гетерозидах / гесперидин метил халькон / кислота аскорбиновая

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от « 22 » 11 2022 № 1623

Уважаемый пациент,

перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда применяйте данный лекарственный препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат предназначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через несколько дней в случае обострения геморроя или через 14 дней при нарушениях венозного кровообращения, необходимо обратиться к врачу.

В настоящем листке-вкладыше приводится следующая информация:

1. Что такое препарат ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы и для чего он используется
2. Что Вам следует знать до начала применения препарата ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы
3. Как принимать препарат ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Как хранить препарат ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы
6. Содержимое упаковки и другая информация.

1. ЧТО ТАКОЕ ПРЕПАРАТ ЦИКЛО З ФОРТ, КАПСУЛЫ И ДЛЯ ЧЕГО ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Фармакотерапевтическая группа

ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, СНИЖАЮЩИЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КАПИЛЛЯРОВ.
КОД АТХ: C05CX.

Что такое препарат ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы

ЦИКЛО З ФОРТ представляет собой комбинацию трех действующих веществ: экстракта иглицы, гесперидин метил халькона и аскорбиновой кислоты (витамина С).

ЦИКЛО З ФОРТ относится к группе препаратов, снижающих проницаемость капилляров (сердечно-сосудистой системы).

Данный препарат является венотоническим и флебопротекторным средством (повышает тонус вен и резистентность сосудов и снижает их проницаемость.) Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Для чего он используется

Препарат применяется у взрослых:

- симптоматическое лечение венозно-лимфатической недостаточности (с такими проявлениями, как тяжесть в ногах, боль, неприятные ощущения - так называемый «синдром усталых ног», проявляющийся в состоянии покоя;
- лечение функциональных симптомов приступов геморроя.

2. ЧТО ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ДО НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЦИКЛО З ФОРТ, КАПСУЛЫ

Не принимайте препарат ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы:

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на любое из действующих веществ (экстракт иглицы, гесперидин метил халькон, и/или аскорбиновая кислота) или другие вспомогательные вещества, входящие в состав данного лекарственного препарата, указанные в разделе 6;
- если вы страдаете нарушением обмена железа (талассемия, гемохроматоз, сидеробластная анемия) в связи с наличием аскорбиновой кислоты (витамина С) в составе данного лекарственного препарата;
- если ваш возраст менее 18 лет (препарат содержит краситель Е110).

Особые указания и меры предосторожности при применении

Перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Особые указания

- В случае развития диареи следует прекратить лечение и обратиться к врачу (см. раздел 4 «**Какие возможны нежелательные реакции могут быть**»).
- Нарушение венозного кровотока: если через 15 дней лечения не наблюдается улучшений в отношении болезненных ощущений и/или ломкости сосудов, необходима консультация лечащего врача.
- Обострение геморроя: применение данного лекарственного препарата не снимает необходимости специфического лечения других проктологических заболеваний. Если геморроидальные расстройства сохраняются после нескольких дней лечения необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Меры предосторожности при применении

Нарушение венозного кровообращения.

Данный лекарственный препарат наиболее эффективен в сочетании со здоровым образом жизни.


Избегайте воздействия солнца, жары, длительного пребывания в стоячем положении, набора избыточного веса.

Ходьба и в некоторых случаях ношение компрессионных чулок улучшает кровообращение.

Аскорбиновая кислота (витамин С) может влиять на результаты биохимических исследований в отношении показателей уровня глюкозы в крови, уровня билирубина, измерения активности трансаминаз, лактатов и других параметров.

Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ

Данный лекарственный препарат ЦИКЛО З ФОРТ содержит азокраситель Е110 и может вызывать аллергические реакции.



1626 - 2020

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать любые другие лекарственные препараты.

Взаимодействие с продуктами питания, напитками и алкоголем

Не применимо.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете беременность, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, прежде чем принимать данный лекарственный препарат.

В качестве предупредительной меры предпочтительно не применять ЦИКЛО З ФОРТ во время беременности и грудного вскармливания.

Спортивные соревнования

Не применимо.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Не применимо.

3. КАК ПРИНИМАТЬ ПРЕПАРАТ ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы

Всегда применяйте данный лекарственный препарат в полном соответствии с информацией, приведенной в данном листке-вкладыше, или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. В случае сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендованная доза.

При венозно-лимфатической недостаточности 2-3 капсулы в день.

При приступах геморроя 4-5 капсул в день.


Способ применения.

Данный лекарственный препарат предназначен для перорального приема.

Капсулы следует проглатывать целиком, запивая стаканом воды.

Продолжительность применения:

- при нарушении венозного кровообращения: если через 15 дней лечения не наблюдается улучшений в отношении болезненных ощущений и/или ломкости сосудов, необходима консультация лечащего врача;
- при обострении геморроя: лечение должно быть кратковременным. Если симптомы геморроя сохраняются в течение нескольких дней лечения (не более недели), обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

**Применение у детей и подростков**

Противопоказан: возраст до 18 лет (содержит азокраситель (E110)).

Если вы приняли препарата больше, чем следовало

Чрезмерные дозы аскорбиновой кислоты (действующее вещество в составе препарата ЦИКЛО З ФОРТ) могут привести к развитию гемолитической анемии у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД).

Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если вы забыли принять ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы:

1626 - 2020

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать разовую дозу, которую вы забыли принять.

Если вы перестали принимать ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы:

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого препарата, обратитесь за дополнительной информацией к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Как и все лекарственные препараты, этот препарат может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не всегда и не у всех.

Могут возникнуть следующие нежелательные реакции:

- часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): диарея иногда бывает значительной и быстро проходит после прекращения лечения (см. раздел 2), боль в животе;
- нечасто (возникают у 1-10 пациентов из 1000): бессонница (трудности с засыпанием), диспепсия (функциональное расстройство пищеварения), тошнота, эритема (покраснение кожных покровов), зуд, мышечные спазмы, боль в конечностях (руках и/или ногах);
- редко (возникает менее чем у 1 из 1000): тревожность, головокружение, ощущения холода в конечностях (холодные руки и/или ноги), боль в венах, желудочно-кишечные расстройства, афтозный стоматит (воспаление полости рта с образованием пузырьков), повышение уровня аланинаминотрансферазы (повышение лабораторного показателя повреждения печени);
- неизвестно (частоту невозможно оценить по имеющимся данным): боль в животе, макулопапулезная эритема (сыпь на коже) и крапивница (красные приподнятые над поверхностью кожи бляшки, сопровождаемые зудом), колит (воспаление кишечника), обратимый после прекращения лечения.

Сообщение о побочных эффектах

При возникновении каких-либо нежелательных реакций сообщите об этом вашему врачу или фармацевту. Это относится и к реакциям, не перечисленным в этом листке-вкладыше. Вы можете также сообщить о возникновении нежелательных реакций, направив информацию в Республиканскую клинико-фармакологическую лабораторию РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». Интернет-страница: www.rceth.by.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете собрать больше информации о безопасности данного лекарственного препарата.

5. КАК ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы


Хранить в недоступном для детей месте.

Не используйте данный лекарственный препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после формулировки (Годен до: месяц/год). Дата окончания срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Особые меры предосторожности при хранении не требуются.

Не выбрасывайте лекарственный препарат через канализацию или с бытовыми отходами. Обратитесь к фармацевту по вопросу утилизации не используемого более препарата. Эти меры помогут защитить окружающую среду.



1626 - 2020

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**Что содержит препарат ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы****Действующие вещества**

Одна капсула содержит:

Сухой экстракт иглицы, титрованный в стероловых гетерозидах.....	150,0 мг
Гесперидин метил халькон.....	150,0 мг
Кислота аскорбиновая (витамин С)	100,0 мг

Вспомогательные вещества

Тальк, магния стеарат, кремний коллоидный безводный, макрогол 6000.

Состав оболочки капсулы: краситель хинолиновый желтый (E104), краситель желтый «солнечный закат» S (E110), титана двуокись (E171), желатин (см. раздел 2: ЦИКЛО З ФОРТ содержит: краситель желтый «солнечный закат» S (E110)).

Внешний вид ЦИКЛО З ФОРТ, капсулы и содержимое упаковки

Данный препарат доступен в виде капсул (корпус непрозрачного желтого цвета с непрозрачным колпачком оранжевого цвета).

10 капсул в блистере из ПВХ/ПЭ/ПВДХ/алюминиевая фольга.

3 блистера упакованы вместе с листком-вкладышем в картонную коробку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ПЬЕР ФАБР МЕДИКАМЕНТ (PIERRE FABRE MEDICAMENT)

Ле Кокийю, 81500 Лавор, Франция (Les Cauquillous - 81500 Lavaur – France).

Производитель

ПЬЕР ФАБР МЕДИКАМЕНТ ПРОДАКШН (PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION)

Производственный участок ПРОГИФАРМ (PROGIPHARM)

РЮ ДУ ЛИСЕ (RUE DU LYCÉE)

45500, ЖИЕН (45500 GIEN)

ФРАНЦИЯ (FRANCE).

Дата последней редакции данного листка-вкладыша:

[Заполняется держателем]

