


Листок-вкладыш лекарственного средства**Торговое название лекарственного средства**

Циклодинон®

Лекарственная форма

капли для внутреннего применения

**Состав**

1 г капль содержат: 0,00240 г прутняка обыкновенного плодов экстракт сухой (7-11:1);
экстрагирующее вещество: этиловый спирт 70% об.

Вспомогательные вещества: повидон 30, сорбитола раствор 70%

некристаллизующийся, полисорбат, сахарин натрий, мяты перечной ароматизатор,
этиловый спирт 96%, вода очищенная

Содержание этанола: 17% - 19% (в объёмном соотношении).

Описание

прозрачная или мутная желто-коричневая жидкость со специфическим запахом. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Фармакологические свойства

компоненты лекарственного средства оказывают нормализующее действие на концентрацию половых гормонов.

Основным активным компонентом лекарственного средства является прутняк обыкновенный (*Agnus castus*). Дофаминергические эффекты препарата, вызывая снижение продукции пролактина, устраняют гиперпролактинемия. Повышенная концентрация пролактина нарушает секрецию гонадотропинов, в результате чего могут возникнуть нарушения созревании фолликулов, овуляции и образования желтого тела, что в дальнейшем ведет к дисбалансу между эстрадиолом и прогестероном и может вызвать нарушения менструального цикла, а также мастодию. В отличие от эстрогенов и других гормонов, пролактин оказывает также прямое стимулирующее действие на пролиферативные процессы в молочных железах, усиливая образование соединительной ткани и вызывая расширение молочных протоков. Снижение содержания пролактина приводит к обратному развитию патологических процессов в молочных железах и купирует болевой синдром. Ритмичная выработка и нормализация соотношения гонадотропных гормонов приводит к нормализации второй фазы менструального цикла.

Показания к применению

Нарушение менструального цикла, предменструальный синдром, мастодия.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, опухоли гипофиза, карцинома молочной железы.

Применение в период беременности или кормления грудью

Лекарственное средство не следует применять женщинам во время беременности и в период кормления грудью.

Способ применения и дозировка

Принимают по 40 капль один раз в день, в утреннее время.

Перед употреблением флакон следует взболтать.

Лекарственное средство Циклодинон® следует принимать в течение нескольких месяцев без перерыва во время менструации.

После исчезновения симптомов и улучшения состояния следует продолжить лечение в течение нескольких недель.

Побочные эффекты

По данным литературных источников при приеме лекарственных средств, содержащих плоды прутняка обыкновенного, имели место такие симптомы как головная боль, зуд или нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, боли в верхней или нижней части живота). Кроме того, описывались случаи повышенной чувствительности (кожная сыпь, крапивница, отек Квинке, одышка и затруднение проглатывания). Имеются данные о редких случаях преходящего психомоторного возбуждения, спутанности сознания и галлюцинаций.

При появлении первых признаков повышенной чувствительности прием лекарственного средства следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном приеме антагонистов дофаминовых рецепторов возможно взаимное ослабление действия.

На настоящий момент сведения о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

В случае возникновения при приеме лекарственного средства болей и набухания в молочных железах, а также в случае менструальных нарушений рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Регулирование нарушений менструального цикла может повысить вероятность наступления беременности.

При редкой наследственной непереносимости фруктозы применение лекарственного средства Циклодинон® капли возможно только после консультации с врачом.

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем или механизмами.

Условия хранения и срок годности

4 года. После вскрытия флакона 6 месяцев. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Флаконы темного стекла по 50 или 100 мл.

Условия отпуска

Без рецепта

Производитель

БИОНОРИКА СЕ

Кершенштайнерштрассе 11-15,

92318 Ноймаркт

Германия

Представительство в Республике Беларусь

220095 г. Минск, пр. Рокоссовского 64, пом.2 Н

тел/факс (+375 17) 211-40-08, 211-40-13

e-mail office@bionorica.by