


**ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению препарата  
(информация для пациентов)

**Хартил®-Д таблетки 2,5 мг/12,5 мг**  
**Хартил®-Д таблетки 5 мг/25 мг**  
(рампиприл в комбинации с диуретиком)



**Полностью и внимательно прочтите эту инструкцию до начала приема данного лекарственного средства.**

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту.
- Это лекарственное средство назначено именно Вам, не следует передавать его другим людям. Оно может нанести вред их здоровью, даже если у них наблюдаются такие же симптомы заболевания, как у Вас.
- Если Вас будет серьезно беспокоить какой-либо побочный эффект, или Вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, сообщите об этом своему врачу или фармацевту (см. раздел 4).

**Данный листок-вкладыш содержит следующую информацию:**

1. Что такое препарат Хартил®-Д и для чего он применяется
2. Что следует знать до начала приема таблеток Хартил®-Д
3. Как следует применять таблетки Хартил®-Д
4. Возможное побочное действие
5. Как следует хранить таблетки Хартил®-Д
6. Срок годности
7. Условия отпуска из аптек
8. Дополнительная информация

### **1. Что такое препарат Хартил®-Д и для чего он применяется**

Препарат Хартил®-Д содержит комбинацию двух активных веществ, рамиприла и гидрохлоротиазида, снижающих высокое артериальное давление.

*Рамиприл* является ингибитором АПФ (ангиотензин превращающего фермента) и обладает следующими эффектами:

- подавляет выработку веществ, которые способны повышать артериальное давление в Вашем организме;
- расслабляет стенки сосудов и расширяет их;
- облегчает работу сердца по циркуляции крови в организме.

*Гидрохлоротиазид* является мочегонным средством тиазидной группы. Он стимулирует выведение солей и воды почками и также снижает артериальное давление.

Сочетание рамиприла и гидрохлоротиазида применяется для лечения повышенного артериального давления. Эта комбинация оказывает более выраженное антигипертензивное действие, и применяется в случаях, когда принимаемые по отдельности лекарства, являющиеся компонентами этой комбинации, недостаточно эффективны.

### **2. Что следует знать до начала приема таблеток Хартил®-Д**

**Не принимайте таблетки Хартил®-Д**

- если у Вас аллергия на рамиприл, гидрохлоротиазид, а также на любое из вспомогательных веществ, приведенных в разделе 8;
- если у Вас аллергия на лекарственные препараты, похожие на Хартил®-Д (т.е. содержащие другие ингибиторы АПФ или лекарства группы сульфонамидов).  
Симптомами аллергических реакций могут быть кожные высыпания, затрудненное глотание или дыхание, отек губ, языка, лица или горла.
- если у Вас в прошлом наблюдались такие серьезные аллергические реакции как ангионевротический отек, признаками которого могут быть зуд, крапивница, красные пятна на руках, ногах или в горле, отек горла, кожи вокруг глаз или губ, затрудненное глотание или дыхание;
- если Вы получаете лечение гемодиализом или любые другие виды фильтрации крови. В зависимости от применяемой аппаратуры, Хартил®-Д может оказаться неподходящим средством для Вашего лечения;
- если у Вас имеются тяжелые нарушения функции печени;
- если у Вас в крови нарушен уровень некоторых солей (кальция, калия, натрия);
- если Вы страдаете почечным заболеванием, при котором нарушается снабжение почек кровью (сужение почечных артерий);
- в последние 6 месяцев беременности (см. раздел «Фертильность, беременность и грудное вскармливание»);
- в период грудного вскармливания (см. раздел «Фертильность, беременность и грудное вскармливание»);
- если Вы страдаете диабетом, нарушением функции почек или, если Вам назначено лечение препаратами, понижающими артериальное давление, которые содержат алискирен;
- Если Вы принимаете препарат, состоящий из двух компонентов – сакубутрила и валсартана. Если Вы приняли сакубутрил/валсартан, подождите 36 часов после принятия последней дозы этого препарата прежде, чем принять рамиприл/амлодипин (см. раздел «Другие лекарственные средства и препарат Хартил®-Д»).

Не принимайте Хартил®-Д, если у Вас имеется любое из вышеприведенных состояний. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом, прежде, чем начать принимать Хартил®-Д.

#### **Меры предосторожности при медицинском применении**

Перед началом приема препарата Хартил®-Д проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом.

*Обязательно сообщите врачу или фармацевту о наличии перечисленных состояний до начала лечения:*

- если у Вас имеются нарушения функции сердца, печени или почек;
- если у Вас были значительные потери жидкости или солей, связанные с сильной рвотой, поносом, потением, диетой, бедной солями, длительным приемом мочегонных средств, или с лечением гемодиализом (искусственная почка);
- при проведении десенсибилизирующей терапии после укуса ос или пчел с целью уменьшения аллергической реакции на яд насекомых;
- если у Вас запланирована хирургическая операция с наркозом, в том числе при обезболивании стоматологических процедур. Хартил®-Д следует отменить за один день до планируемого вмешательства. Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом!
- если при лабораторном исследовании крови выявлено повышение уровня калия;

- если Вы принимаете любой препарат или страдаете заболеванием, которое может привести к понижению уровня натрия в крови. В данном случае Ваш лечащий врач может назначить Вам проведение регулярных анализов крови с целью контроля уровня натрия. Это особенно важно для пожилых пациентов;
- если Вы страдаете так называемым коллагенозным заболеванием, например, склеродермой или системной красной волчанкой;
- сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы предполагаете, что беременны (или имеется вероятность беременности). Применение Хартил®-Д не рекомендуется в первые 3 месяца беременности, а после первых трех месяцев он может вызвать тяжелые нарушения развития плода (см. раздел «Фертильность, беременность и грудное вскармливание»);
- если у Вас ухудшилось зрение или Вы ощущаете боль в глазах, особенно, если у Вас повышен риск развития повышенного внутриглазного давления (глаукомы);
- если Вы принимаете так называемые ингибиторы mTOR (темсиролимус, эверолимус, сиролимус), а также вилдаглиптин или рацекадотрил (может повыситься риск развития ангионевротического отека);
- если Вы принимаете любой из нижеприведенных препаратов, понижающих артериальное давление:
  - блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА), также известные как сартаны, например, валсартан, телмисартан, ирбесартан, особенно, если Вы страдаете почечными заболеваниями, связанными с диабетом;
  - алискирен.

Возможно, Ваш лечащий врач будет регулярно проверять функцию почек, измерять Ваше артериальное давление и уровень электролитов (калия) в крови.

Также ознакомьтесь с информацией, приведенной в разделе «Не принимайте таблетки Хартил®-Д в следующих случаях».

*Если у Вас имеется какое-либо из вышеприведенных состояний (или Вы не уверены в этом), проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом, прежде чем начать прием препарата.*

#### **Дети и подростки в возрасте до 18 лет**

Препарат Хартил®-Д не рекомендуется для лечения детей и подростков младше 18 лет в связи с отсутствием клинического опыта.

#### **Другие лекарственные средства и препарат Хартил®-Д**

Сообщите Вашему лечащему врачу или фармацевту, если Вы в настоящее время принимаете, недавно принимали или планируете принимать другие лекарственные препараты.

Это важно, потому что Хартил®-Д может повлиять на эффект ряда препаратов и наоборот, другие лекарственные средства могут повлиять на действие препарата Хартил®-Д.

Возможно, у Вашего лечащего врача возникнет необходимость изменить дозу препарата или принять иные меры предосторожности, которые приведены ниже:

*Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете какие-либо из нижеперечисленных лекарственных препаратов:*

- лекарственные средства - блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) или алискирен (см. также информацию в разделах «Не принимайте таблетки Хартил®-Д в следующих случаях» и «Меры предосторожности при медицинском применении»);
- обезболивающие и противовоспалительные средства (нестероидные противовоспалительные средства, например, ибупрофен, индометацин, аспирин);
- препараты для лечения низкого артериального давления, шока, сердечной

недостаточности, астмы или аллергических состояний, таких как эфедрин, норадреналин или адреналин. Ваш лечащий врач должен периодически контролировать Ваше артериальное давление.

*Также сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете какие-либо из нижеперечисленных лекарственных средств, так как при их одновременном применении с Хартил®-Д может повыситься вероятность развития побочных реакций:*

- препарат, содержащий два действующих вещества: сакубутрил и валсартан. Не принимайте Хартил®-Д с препаратом, содержащим сакубутрил/валсартан. Если Вы приняли сакубутрил/валсартан, подождите 36 часов после принятия последней дозы, прежде, чем начать принимать препарат Хартил®-Д (см. раздел «Не принимайте таблетки Хартил®-Д»). Если Вы закончили прием препарата Хартил®-Д, подождите 36 часов после принятия последней дозы, прежде, чем начать принимать сакубутрил/валсартан;
- обезболивающие и противовоспалительные средства (нестероидные противовоспалительные средства, например, ибупрофен, индометацин, аспирин);
- препараты, понижающие уровень калия в крови, среди которых встречаются лекарства от запора, мочегонные средства, амфотерицин Б (для лечения грибковых инфекций) и АКТГ (гормон, который используется для определения, насколько хорошо функционируют надпочечники);
- противоопухолевые препараты (химиотерапевтические препараты);
- лекарства для лечения заболеваний сердца (включая нарушения сердечного ритма);
- лекарства, предотвращающие отторжение пересаженных органов, например, циклоспорин;
- мочегонные препараты, например, фуросемид;
- лекарственные средства, повышающие уровень калия в крови, например, спиронолактон, триамтерен, амилорид, соли калия, триметоприм или его комбинация с сульфаметоксазолом (антибиотик для лечения некоторых бактериальных инфекций), гепарин (средство для разжижения крови);
- противовоспалительные стероиды, например, преднизолон;
- препараты для восполнения недостатка кальция;
- аллопуринол (для понижения уровня мочевой кислоты в крови);
- прокаинамид (для лечения нарушений сердечного ритма);
- холестирамин (для понижения уровня липидов в крови);
- карбамазепин (для лечения эпилепсии);
- гепарин (препарат для разжижения крови);
- темсиrolimus (препарат для лечения рака);
- сиролimus, эверолимус (для предотвращения отторжения пересаженных органов);
- вилдаглиптин (для лечения сахарного диабета 2-го типа);
- рацекадотрил (препарат для лечения диареи).

*Также сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете какие-либо из нижеперечисленных лекарственных средств, так как при их одновременном применении с Хартил®-Д последний может повлиять на эффективность этих препаратов:*

- препараты для лечения сахарного диабета (препараты, понижающие уровень сахара в крови, предназначенные для приема внутрь, а также инсулин). Хартил®-Д может понизить уровень сахара в крови. Регулярно контролируйте уровень сахара в крови, если Вы принимаете Хартил®-Д;
- литий (для лечения психиатрических заболеваний). Хартил®-Д может повысить уровень лития в крови. Ваш лечащий врач должен регулярно определять уровень

- лития в крови;
- препараты, расслабляющие мышцы;
  - хинин (для лечения малярии);
  - препараты, содержащие йод (применяются в стационарах для рентгенологических исследований и других методов визуализации);
  - пенициллин (антибиотик для лечения инфекций);
  - препараты для приема внутрь с целью разжижения крови (например, варфарин).

Если что-то из вышеприведенного относится к Вам (или Вы не уверены), проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом, прежде, чем начать прием препарата.

### **Результаты лабораторных анализов**

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом по следующим вопросам:

- если у Вас запланировано обследование паразитовидной железы, так как Хартил®-Д может повлиять на результаты обследования;
- если Вы спортсмен и Вам планируют провести допинговый тест – Хартил®-Д может дать ложно - положительный результат теста.

### **Прием препарата Хартил®-Д с пищей и напитками**

- при применении Хартил®-Д со спиртными напитками может возникнуть головокружение или чувство неуверенности. Если Вы не уверены, сколько спиртного Вы употребили при одновременном приеме таблеток Хартил®-Д, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом, так как препараты, понижающие артериальное давление, и алкоголь могут взаимно усиливать эффекты друг друга;
- Хартил®-Д можно принимать независимо от приема пищи, в том числе и во время еды.

### **Фертильность, беременность и грудное вскармливание**

#### Беременность

Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы думаете, что беременны (или имеется вероятность беременности).

Применение Хартил®-Д не рекомендуется в первые 12 недель беременности, а начиная с 13 недели беременности Хартил®-Д противопоказан, так как он может вызвать тяжелые нарушения развития плода.

Немедленно сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы забеременели во время лечения препаратом Хартил®-Д. При запланированной беременности рекомендуется избрать альтернативный метод лечения.

#### Период грудного вскармливания

Хартил®-Д нельзя применять при грудном вскармливании.

*Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом, прежде чем начать принимать любой лекарственный препарат, если Вы беременны или кормите ребенка грудью.*

### **Управление транспортными средствами и механизмами**

Хартил®-Д может вызывать головокружение, особенно в начале лечения и при повышении дозы. При головокружении не управляйте автотранспортом и не выполняйте опасных видов деятельности.

### **Таблетки Хартил®-Д содержат лактозу (моногидрат лактозы)**

Хартил®-Д таблетки 2,5 мг/12,5 мг – 25 мг лактозы в каждой таблетке;

Хартил®-Д таблетки 5 мг/25 мг – 50 мг лактозы в каждой таблетке.

Если у Вас имеется непереносимость некоторых типов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед началом использования этого медицинского средства.

### 3. Как следует применять таблетки Хартил®-Д

#### Режим дозирования

*Всегда принимайте Хартил®-Д в дозе, назначенной Вашим лечащим врачом. При возникновении вопросов по поводу дозировки обращайтесь к врачу или фармацевту.*

#### *Для лечения высокого артериального давления*

Ваш лечащий врач может изменить дозы препарата с целью достижения соответствующего артериального давления. Продолжительность курса лечения определяется врачом.

#### *Дозы для пожилых пациентов*

Рекомендуемые начальные дозы для пожилых, как правило, ниже обычных. Начальные и поддерживающие дозы должны быть подобраны врачом индивидуально, в ходе лечения.

#### *Дети и подростки в возрасте до 18 лет*

Детям и подросткам младше 18 лет не следует использовать препарат Хартил®-Д за отсутствием данных по эффективности и безопасности рамиприла в этой возрастной группе.

#### **Если Вы приняли больше таблеток Хартил®-Д, чем назначено**

*немедленно обратитесь в отделение экстренной помощи ближайшей больницы. Не управляйте автомобилем – попросите, чтобы Вас отвезли или вызовите скорую помощь. Возьмите с собой эту инструкцию и оставшиеся таблетки, чтобы врач точно знал, какие таблетки Вы приняли.*

#### **Если Вы забыли вовремя принять таблетку Хартил®-Д**

- примите следующую таблетку в обычное время приема следующей таблетки;
- не принимайте двойную дозу препарата Хартил®-Д, чтобы скомпенсировать пропущенный прием.

#### Способ применения

- Хартил®-Д следует принимать внутрь ежедневно один раз в день, предпочтительно утром.
- Таблетки следует принимать, запивая жидкостью.
- Таблетки Хартил®-Д можно принимать вне зависимости от приема пищи: их можно принимать натощак, во время или после еды, не разжевывая.
- Таблетки можно разделить на две одинаковые дозы, разламывая по риске.

Принимайте Хартил®-Д, строго соблюдая назначения врача.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по применению данного препарата, обратитесь к врачу или фармацевту.

### 4. Возможное побочное действие

Как все лекарственные препараты, Хартил®-Д также может иметь побочное действие, однако, оно проявляется не у каждого пациента.

**Если у Вас наблюдаются любые из нижеприведенных побочных действий, немедленно прекратите прием препарата Хартил®-Д и обратитесь к Вашему лечащему врачу, так как при этом не исключена необходимость неотложного медицинского вмешательства:**

- отек лица, губ или горла (в связи с чем может развиваться затруднение глотания или дыхания), зуд, или кожные высыпания – это может быть признаками тяжелой аллергической реакции на препарат Хартил®-Д;

- тяжелые кожные реакции, такие как высыпания, образование язв во рту, ухудшение течения имеющихся кожных заболеваний, покраснение кожи, образование пузырьков или отслоение кожи (т.н. синдром Стивена-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз или болезнь, называемая мультиформная эритема).

**Немедленно сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы наблюдаете любое из нижеприведенных состояний:**

- учащенный или нерегулярный сердечный ритм, интенсивное, учащенное сердцебиение, боль или ощущение сдавления в груди, тяжелое заболевание сердца, в том числе инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг;
- ощущение нехватки воздуха или кашель, температура на протяжении 2-3 дней, понижение аппетита – все это может быть признаком нарушения функции легких (включая воспаление);
- легко образующиеся кровоподтеки, длительные кровотечения или любые признаки, указывающие на кровотечение (например, кровоточащие десны), синеватые точки на коже размером с булавочную головку, развивающиеся чаще, чем обычно, инфекционные заболевания, боль в горле, лихорадка, утомляемость, слабость, головокружение или бледность. Это могут быть признаки нарушения кроветворения и функции костного мозга;
- резкая боль в области желудка, иррадирующая в спину- это может быть признаком панкреатита (воспаления поджелудочной железы);
- лихорадка, озноб, утомляемость, отсутствие аппетита, тошнота, желтоватый оттенок кожи или глаз. Это могут быть признаки гепатита (воспаление печени) или печеночной недостаточности;
- острая боль в глазах, размытость зрения или появление светящихся контуров вокруг источников света, головная боль, сильное слезотечение, тошнота или рвота – все эти симптомы могут указывать на развитие глаукомы. Ухудшение зрения и близорукость – состояние, которое называется миопия.

**Кроме вышеприведенных, могут развиваться и другие побочные эффекты:**

**Частые:** встречаются у 1 – 10 пациентов из 100:

- головная боль или ощущение слабости, или утомляемости;
- головокружение. Чаще развивается в начале лечения препаратом Хартил®-Д или при повышении его дозы;
- сухой, раздражающий кашель или бронхит;
- результаты анализа крови указывают на повышение сахара в крови. Если Вы страдаете сахарным диабетом, то его течение может ухудшиться;
- результаты анализа крови указывают на повышение уровня мочевой кислоты или липидов в крови;
- болезненные, покрасневшие, отечные суставы.

**Нечастые:** встречаются у 1 – 10 пациентов из 1 000

- кожные высыпания, возвышающиеся или не возвышающиеся над поверхностью кожи;
- покраснение кожи лица, слабость, гипотония (ненормальное понижение артериального давления), особенно, если Вы быстро встаете или быстро садитесь;
- проблемы, связанные с чувством равновесия (ощущение вращения – вертиго);
- зуд или ненормальные ощущения в коже как, например, онемение, покалывание, ощущение жжения или покалывания и чувство мурашек (нарушение функции периферических нервов);
- утрата или изменение вкусовых ощущений;
- нарушения сна;

- состояние депрессии, тревоги или беспокойства;
- заложенность носа, воспаление придаточных пазух носа, удушье;
- воспаление десен (гингивит), отечность рта;
- покраснение, зуд или отек глаз;
- звон в ушах;
- нечеткость зрения;
- выпадение волос;
- боль в грудной клетке;
- мышечная боль;
- запоры, боль в желудке или кишечнике;
- проблемы переваривания пищи, тошнота;
- повышенное потребление жидкости и мочеиспускание;
- повышенное, по сравнению с привычным, потоотделение;
- пониженный аппетит или отсутствие аппетита (анорексия), пониженное чувство голода;
- учащенный или неправильный ритм сердца;
- отечность рук и ног. Это может быть признаком повышенной задержки жидкости в организме;
- лихорадка;
- нарушение сексуальной функции у мужчин;
- результаты анализа крови, указывающие на понижение количества красных кровяных телец или гемоглобина, понижение количества белых кровяных телец или кровяных пластинок;
- результаты анализа крови, указывающие на изменение функции печени, поджелудочной железы или почек;
- результаты анализа крови, указывающие на понижение, по сравнению с нормальным, уровня калия в крови.

**Очень редкие:** встречаются реже, чем у 1 пациента из 10 000:

- тошнота, начинающийся понос или ощущение жжения в желудке;
- покрасневший, отечный язык, сухость во рту;
- результаты анализа крови, указывающие на повышение, по сравнению с нормальным, уровня калия в крови.

**Частота неизвестна (нельзя определить на основании имеющихся данных):**

Сообщите Вашему лечащему врачу, если любое из нижеприведенных побочных эффектов становится тяжелым или не проходит за несколько дней.

- нарушение концентрации внимания, беспокойство или спутанность сознания;
- цвет пальцев рук и ног на холоде изменяется, а когда конечности вновь согреваются, то появляется ощущение покалывания или болезненности (болезнь Рейно);
- увеличение молочных желез у мужчин;
- тромбоз (образование сгустков крови);
- нарушение слуха;
- сухость глаз;
- зрительное восприятие предметов в желтом цвете;
- повышение внутриглазного давления;
- обезвоживание;
- болезненная припухлость на шее с покраснением кожи (воспаление слюнной железы);



- отек кишечника, называемый ангионевротическим отеком кишечника, который сопровождается болью в животе, тошнотой и поносом;
- выраженное отслоение или шелушение кожи, пустулезная (узелковая) сыпь или иные кожные реакции, как например, высыпания красного цвета на коже лица или на лбу;
- кожные высыпания или кровоизлияния;
- пятнистость кожи и холодные конечности;
- проблемы со стороны ногтей (размягчение или отслоение от ногтевого ложа);
- ригидность (жесткость) мышц и суставов или невозможность движений челюсти (тетания);
- мышечная слабость или спазм;
- понижение либидо у мужчин и женщин;
- появление крови в моче, что может указывать на заболевание почек (интерстициальный нефрит);
- повышение уровня сахара в моче;
- повышение количества некоторых форменных элементов крови (эозинофилия) при анализе крови;
- результаты анализа крови указывают на резкое понижение количества форменных элементов крови (панцитопения);
- результаты анализа крови указывают на изменение уровня калия в крови;
- результаты анализа крови указывают на изменение уровня некоторых солей в крови (кальция, калия, натрия, магния);
- выведение концентрированной мочи (темного цвета), тошнота, мышечные спазмы, спутанность сознания, что может развиться в результате неадекватной секреции антидиуретического гормона. При появлении таких симптомов немедленно обратитесь к врачу;
- замедление или отсутствие реакций;
- изменение обоняния;
- затруднение дыхания или ухудшение астмы.

#### **Сообщение о побочных эффектах**

При обнаружении любых побочных эффектов, в том числе и не упомянутых в данной инструкции, просьба обратиться к врачу или фармацевту.

Сообщая о побочных эффектах, Вы поможете получить дополнительную информацию о безопасности этого препарата.

#### **5. Как следует хранить таблетки Хартил®-Д**

Хранить при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

Не применяйте Хартил®-Д, если заметили явные признаки ухудшения качества (например, изменение цвета).


#### **6. Срок годности**

Срок годности указан на упаковке.

Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке!

Датой истечения срока годности считается последний день указанного месяца.

Лекарственные средства не следует выбрасывать в бытовые отходы или сточные воды. Если необходимо удалить в отходы препарат, который больше не нужен,



проконсультируйтесь с фармацевтом. Эти меры помогут предотвратить загрязнение окружающей среды.

### 7. Условия отпуска из аптек

Отпускается по рецепту врача.

### 8. Дополнительная информация

#### Что содержат таблетки Хартил®-Д

##### Действующие вещества:

каждая таблетка 2,5 мг/12,5 мг содержит 2,5 мг рамиприла и 12,5 мг гидрохлоротиазида;  
каждая таблетка 5 мг/25 мг содержит 5 мг рамиприла и 25 мг гидрохлоротиазида.

*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, гипромеллоза, кросповидон (тип А), целлюлоза микрокристаллическая, натрия стеарилфумарат.

#### Внешний вид таблеток Хартил®-Д и содержимое упаковки

##### Внешний вид:

Хартил®-Д 2,5 мг/12,5 мг: белые овальные таблетки с риской на обеих сторонах, на одной стороне таблетки – гравировка чисел «2.5» и «12.5» по разные стороны от риски.

Хартил®-Д таблетки 5 мг/25 мг: белые овальные таблетки с риской на обеих сторонах, на одной стороне таблетки – гравировка чисел «5» и «25» по разные стороны от риски.

Таблетки можно разделить на равные дозы, разламывая по риске.

##### Упаковка:

По 14 таблеток в блистере из ПВХ/ПХТФЭ/алюминиевой фольги. 2 блистера помещены в картонную пачку вместе с инструкцией по медицинскому применению для пациентов.

### Информация о производителе

#### Владелец торговой лицензии

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»

1106 Будапешт, ул. Керестури 30-38

ВЕНГРИЯ

#### Производитель

Альфамед ФАРБИЛ Арцнаймиттель ГмбХ

37081 Гёттинген, Хильдебрандштрассе, 12

ГЕРМАНИЯ

