


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: информация для пациента

ЛЕКРОЛИН®

**Торговое название.** Лекролин**Международное непатентованное название**

Кромоглициевая кислота

Лекарственная форма

Капли глазные

Состав

1 мл раствора содержит:

Активное вещество:

Натрия кромогликат – 40 мг

Вспомогательные вещества:

Бензалкония хлорид, динатрия эдетат, глицерин, поливиниловый спирт, вода для инъекций.

Описание

Прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в офтальмологии. Прочие противоаллергические препараты.

Код ATX: S01GX01**Фармакологические свойства**

Противоаллергическое средство; оказывает мембраностабилизирующее действие, препятствует дегрануляции тучных клеток и выделению из них гистамина, брадикинина, лейкотриенов (в том числе, медленно реагирующими субстанциями) и других биологически активных веществ. Является более эффективным в качестве профилактического средства. Полный клинический эффект при аллергических заболеваниях достигается через несколько дней или недель лечения препаратом.

Показания к применению

- Аллергический конъюнктивит

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Беременность и лактация

Не наблюдалось каких-либо известных побочных эффектов у плода при применении лекарственного средства во время беременности. Тем не менее, прием лекарственного средства во время беременности требует обоснованных клинических показаний.

Несмотря на то, что натрия кромогликат экскретируется в грудное молоко, при применении лекарственного средства в рекомендуемых дозах побочные эффекты у ребенка маловероятны.

Способ применения и дозы

Данное лекарственное средство применяется только для введения в глаза. Флакон предназначен только для индивидуального использования.

Взрослые и дети старше 4 лет:

По 1-2 капле в каждый конъюнктивальный мешок 2 раза в сутки.

Дети младше 4 лет: только по назначению врача.

При сезонном аллергическом конъюнктивите лечение нужно начинать сразу после появления первых симптомов или применять профилактически до начала сезона цветения. Лечение продолжают в течение всего сезона цветения или дольше, если симптомы сохраняются.

Не используйте данное лекарственное средство, если раствор мутный.

Перед закапыванием (инстилляцией) глазных капель:


- Тщательно вымойте руки
- Примите удобное положение (сядьте, лягте на спину, встаньте перед зеркалом).

Применение глазных капель


1. Откройте флакон.

Во избежание загрязнения содержимого флакона – ни к чему не прикасайтесь кончиком капельницы.


2. Запрокиньте голову назад. Поместите флакон над глазом (рис.1).



3. Оттяните нижнее веко вниз, посмотрите вверх, слегка сжимая флакон, закапайте капли глазные в глаз (рис. 2).



4. Закройте глаз, слегка прижмите его внутренний угол пальцем в течение 1 минуты. Это поможет вам избежать попадания капель глазных в носослезный канал, повысить их эффективность и уменьшить риск возникновения неблагоприятных системных эффектов (рис.3). Плотно закройте флакон.



При применении нескольких офтальмологических препаратов местного действия, интервалы между их применением должны быть не менее 5 мин.

Побочное действие

При местном применении натрия кромогликата обычно хорошо переносится, и симптомы раздражения глаз проявляются редко.

Частые (>1/100): кратковременное ощущение жжения, местное раздражение глаз и быстро проходящее затуманивание зрения.

Очень редкие (<1/10000): аллергические реакции.

Передозировка

Исследования на животных показали, что местная и системная токсичность натрия кромогликата очень мала. При местном его использовании симптомы передозировки маловероятны. Если всё же отмечаются симптомы передозировки, при необходимости должно быть проведено симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Ранее не отмечалось неблагоприятных взаимодействий натрия кромогликата с другими лекарственными средствами.

Меры предосторожности

Лекролин® содержит в качестве консерванта бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение глаза. Бензалкония хлорид может осаждаться в мягких контактных линзах и вызывать обесцвечивание линз. Если использование контактных линз совершенно необходимо во время лечения лекарственным средством Лекролин®, перед инстилляцией капель глазных контактные линзы следует вынуть, и вставить обратно не ранее чем через 15 минут после применения лекарственного средства.

Влияние на способность управлять автомобилем и механическими устройствами

В случае каких-либо преходящих нарушений зрения пациентам следует рекомендовать подождать, пока зрение не восстановится, и лишь затем управлять автомобилем или эксплуатировать механическое оборудование.

Формы выпуска

По 5 мл помещают в белый флакон из полиэтилена низкой плотности с пробкой-капельницей и белой навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия.

По одному флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению упаковывают в картонную пачку.

Срок годности

3 года. Использовать в течение 28 дней после первого вскрытия флакона.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Владелец регистрационного удостоверения

АО Сантен, Нийтюхаанкату 20, 33720 Тампере, Финляндия

Производитель

АО НекстФарма, Нийтюхаанкату 20, 33720 Тампере, Финляндия

Вторичная упаковка

Мануфакчуринг Пекиджин Фармака (МПФ) Б.В.

Нептуунус 12, 8448CN Херенвен, Нидерланды

Выпускающий контроль качества

АО Сантен, Келлопортинкату 1, 33100 Тампере, Финляндия