



**Инструкция
по медицинскому применению лекарственного средства
(информация для пациентов)**

ПЕРМЕТРИН

Торговое название

Перметрин

Международное непатентованное название

Permethrin

Форма выпуска

Спрей для наружного применения 5 мг/г

Состав

Один баллон (50 г) содержит:

активное вещество: перметрин – 250 мг;

спомогательные вещества: этоний, бензалкония хлорид, этианол (96 %), вода очищенная.

Описание

Прозрачная жидкость бесцветная или слабо желтого цвета с характерным спиртовым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для уничтожения эктопаразитов, включая средства против чесоточного клеща, инсектициды и репеленты. Пиретрины, включая синтетические соединения

Код ATC: P03AC04

Показания для применения

Педикулез (головной, лобковый).

Способы применения и дозировка

Наружно. Перед применением препарата волосы следует вымыть и просушить полотенцем. Нажимают на головку распылителя и распыляют лекарственное средство на волосы, втирая его в корни волос. При распылении лекарственного средства конец распылителя необходимо держать на расстоянии 3 см от волос.

После обработки лекарственное средство оставляют на волосах на 10-40 минут (голову можно накрыть платком), затем тщательно смывают теплой проточной водой и высушивают обычным способом. После мытья волосы расчесывают густым гребешком для удаления погибших паразитов; при обнаружении живых вшей обработку повторяют через 7 дней. Для достижения оптимального эффекта в течение 3-х дней после применения препарата не рекомендуется мыть волосы с использованием моющего средства (шампуня), мытье водой допускается.

Расход лекарственного средства в зависимости от густоты и длины волос – от 10 мл до 60 мл.

При лобковом педикулезе спрей распыляют короткими нажатиями на головку распылителя до полного покрытия всей волосистой части лобковой зоны.

Через 30 минут обработанные участки тщательно промывают водой.

Побочное действие

В отдельных случаях возможны:

Аллергические реакции: кожные высыпания и отечность.

Местные реакции: ощущение жжения, покалывания или **пощипывания, онемения кожи, усиление зуда, эритема.**
Со стороны нервной системы: головные боли, парестезия, головокружение.
Со стороны дыхательной системы: затрудненное дыхание.
со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к перметрину и вспомогательным веществам лекарственного средства. Нарушения целостности кожи, воспалительные процессы и вторичные инфекции кожи. Беременность, кормление грудью. Не рекомендуется применение лекарственного средства больным бронхиальной астмой, обструктивным бронхитом, в том числе в анамнезе, в связи с риском возникновения бронхоспазма при вдыхании лекарственного средства. Детский возраст до 3 лет.

Передозировка

При передозировке возможно усиление симптомов, указанных в разделе «Побочные эффекты». При передозировке необходимо прекратить применение средства, промыть кожу большим количеством теплой воды, также возможно применение антигистаминных средств. В случае отравления через вдыхание паров средства лечение необходимо начинать с выведения пациента на свежий воздух. Если средство попало в глаза или на кожу, пораженные участки необходимо промыть достаточным количеством воды.

При случайном применении средства внутрь большая вероятность спонтанной рвоты, поэтому дальнейший прием рвотных средств не рекомендуется в связи с риском быстрого развития судорог и комы. Всасыванию лекарственного средства можно помешать, промыв желудок и приняв активированный уголь или слабительное средство. Лечение прежде всего поддерживающее и включает наблюдение за пациентом на предмет проявления аллергических реакций.

Меры предосторожности

Медперсонал, работающий с лекарственным средством, должен пользоваться защитными перчатками. Лекарственное средство следует применять только наружно. Лекарственное средство содержит бензалкония хлорид, который вызывает раздражение и может вызвать кожные реакции.

Обработку проводят в хорошо проветриваемом помещении или на улице. При обработке следует избегать попадания спрея на слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости, мочеполовых органов. В случае нечаянного попадания лекарственного средства на слизистые оболочки последние следует промыть большим количеством воды. После обработки нужно тщательно вымыть руки с мылом и прополоскать рот проточной водой.

Для предупреждения повторного заражения всю семью необходимо проверить на наличие возбудителей; обработать волосы тем лицам, которые контактировали с больным; продезинфицировать одежду, головные уборы, шарфы, постельное белье, расчески и т.д.

Обработку следует проводить только в том случае, если были обнаружены гниды или живые вши.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не установлено

Применение в период беременности и кормления грудью

Безопасность применения при беременности и в период лактации не доказана. В качестве меры предосторожности не следует использовать лекарственное средство беременным или кормящим грудью женщинам.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Данные о влиянии на способность управлять автомобилем и работать с механизмами отсутствуют.

Упаковка

По 50 г в баллоне алюминиевом с клапаном насосного типа. Баллоны обеспечены распылителем и защитным колпачком.

Каждый баллон с распылителем, защитным колпачком и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Препарат не должен применяться по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Информация о производителе (заявителе)

Произведено и расфасовано (заявитель)

АО «Стома», Украина

61105 г. Харьков, ул. Ньютона, 3

Упаковано

ООО «БЕЛАЛЕК», Республика Беларусь

222163 г. Жодино, ул. Советская, 9

тел.: +375447777701

e-mail: belalek@tut.by