

ИНСТРУКЦИЯ
(информация для потребителя)
по медицинскому применению лекарственного средства
ЛИНКАС сироп

Торговое название: ЛИНКАС.

Лекарственная форма: сироп.

Описание: сироп коричневого цвета с характерным запахом.

Состав:

10 мл сиропа содержат:

Активные вещества: густые водные экстракты

Адхатоды сосудистой листвьев (5:1) – 120,0 мг, перца длинного плодов (4:1) – 25,0 мг, кордии широколистной плодов (4:1) – 25,0 мг, алтея лекарственного семян (4:1) – 25,0 мг, зизифуса обыкновенного плодов (4:1) – 25,0 мг, оносмы прицветниковой листвьев (4:1) – 25,0 мг, солодки голой корневищ с корнями (4:1) – 18,75 мг, иссопа лекарственного листвьев (4:1) – 12,5 мг, калгана большого корневищ (4:1) – 12,5 мг, фиалки душистой листвьев (4:1) – 6,25 мг.

Вспомогательные вещества:

Сахароза, пропиленгликоль (E1520), глицерин (E422), лимонная кислота безводная (E330), метилпарабен (E218), пропилпарабен (E216), масло мяты перечной, масло гвоздичное, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях.

Код ATХ: R05X

Фармакологические свойства

Комплексное лекарственное средство на основе растительного сырья. Снижает интенсивность и увеличивает продуктивность кашля, оказывает отхаркивающее, муколитическое и противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют, лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества.

Показания к применению

В составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (фарингит, трахеит, бронхит). Препарат является традиционным лекарственным средством для использования по указанным показаниям исключительно на основе длительного использования.

Способ применения и дозирование

Взрослые: по 10 мл (следует использовать прилагаемый мерный стаканчик) 3-4 раза в день.

Применение лекарственного средства у детей до 18 лет противопоказано.

Длительность применения препарата 5 – 7 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.


Перед употреблением взбалтывать.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Заболевания печени и/или почек, артериальная гипертензия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипокалиемия, сахарный диабет, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-



галактозная мальабсорбция, недостаточность сахаразы-изомальтазы, детский возраст (до 18 лет), беременность и период лактации.

Передозировка

При передозировке могут наблюдаться симптомы, характерные для отдельных компонентов препарата.

Симптомами передозировки корня солодки являются задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая энцефалопатия.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение лекарственного средства. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Экстракт корней солодки может вызывать снижение эффективности антигипертензивных лекарственных средств. Не рекомендуется одновременное применение с диуретиками, сердечными гликозидами, кортикоステроидами, стимулирующими слабительными или другими лекарственными средствами, влияющими на электролитный баланс.

В случае необходимости одновременного приема других лекарственных средств, необходимо проконсультироваться с врачом.

СОГЛАСОВАНО

Министерством здравоохранения

Республики Беларусь

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

Особые указания и меры предосторожности

Сироп содержит сахарозу, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В одной разовой дозе (10 мл) содержится около 7 г сахарозы, что соответствует 0,58 ХЕ.

В состав препарата входят вспомогательные компоненты метилпарабен (Е 218) и пропилпарабен (Е 216), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).

Данное лекарственное средство содержит экстракт корня солодки. Не следует применять другие средства, содержащие корень солодки из-за риска развития серьёзных побочных реакций, таких как задержка жидкости в организме, нарушение электролитного баланса, артериальная гипертензия, нарушение сердечного ритма.

Линкас содержит экстракт семян алтея. Если во время использования лекарственного средства возникает отышка, лихорадка или гнойная мокрота, следует проконсультироваться с врачом. При одновременном применении с другими лекарственными средствами может произойти задержка их всасывания. В качестве меры предосторожности препарат не следует принимать за полчаса до или после приема других лекарственных препаратов.

Если во время использования лекарственного средства Линкас симптомы ухудшаются, следует проконсультироваться с врачом.

Применение во время беременности и лактации

Применение лекарственного средства во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано в связи с отсутствием данных о безопасности.

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Исследований по оценке влияния применения лекарственного средства на способность к вождению автотранспорта и работе с движущимися механизмами не проведено.

Упаковка

90 мл препарата в стеклянном флаконе янтарного цвета с колпачком, оснащенным защитным кольцом; 1 флакон с инструкцией по применению и мерным стаканчиком в картонной упаковке.

По 120 и по 150 мл препарата в стеклянном флаконе янтарного цвета с колпачком с защитным от детей замком; 1 флакон с инструкцией по применению и мерным стаканчиком в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25⁰С в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Информация о производителе



Herbion Pakistan Private Limited / Хербион Пакистан Прайвейт **СОГЛАСОВАНО**
30/28, Промышленная зона Корангги, Карачи, 74900, Пакистан
Министерством здравоохранения
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Представительство компании «Herbion Pakistan Private Limited» в Республике Беларусь:
220030, г. Минск, пр. Независимости, д.25, к.131, т./ф.: 200-84-01, website: www.herbion.com