

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПЕПСАН-Р

Торговое название: ПЕПСАН-Р


Лекарственная форма: капсулы

Состав на 1 капсулу

Действующие вещества:

Диметикон.....300 мг

Гвайазулен.....4 мг



Вспомогательные вещества:

Желатин, глицерол, сорбитол жидкий 70% некристаллизующийся, патентованный синий V(E131), титана диоксид (E171), вода очищенная.

Описание

Капсулы №5 синего цвета, мягкие, продолговатые, блестящие.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Код АТХ: A03AX

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комбинированный препарат. Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает газообразование в кишечнике.

Гвайазулен – обладает противовоспалительным эффектом.

Диметикон – гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, снижающее газообразование в кишечнике и покрывающее защитной пленкой стенки пищеварительного канала, обладает противовспенивающим действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Симптоматическое лечение функциональных расстройств, сопровождающихся болями при эзофагогастродуоденальных заболеваниях (пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Возможно применение в период беременности и грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Принимать внутрь по 1 капсуле, запивая ½ стакана воды, при возникновении боли.

Нецелесообразно принимать более 4-х капсул в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально.

Дети

Препарат не рекомендуется для применения в педиатрической практике, в связи с недостаточностью данных по эффективности и безопасности.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В редких случаях возможны аллергические реакции, такие как сыпь, зуд кожи; боли и вздутие живота.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Возможно усиление побочных эффектов.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не выявлено.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ АВТОТРАНСПОРТОМ И МЕХАНИЗМАМИ

Не выявлено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Препарат не содержит сахара и поэтому не противопоказан лицам, страдающим диабетом. ПЕПСАН-Р не обладает рентгеноконтрастными свойствами.

В состав препарата входит сорбитол, поэтому не следует принимать данный препарат пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы.

Если симптомы заболевания сохраняются или состояние ухудшается, рекомендуется обратиться к врачу.

УПАКОВКА

По 10 капсул в блистере (ПВХ/ПЭ/ПВДХ/алюминий), по 3 блистера с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

**СРОК ГОДНОСТИ**

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

По рецепту.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Лаборатории РОЗА-ФИТОФАРМА, Франция.